



AXIMAG

CONCIME A BASE DI ELEMENTI SECONDARI
COMPLESSO DI MAGNESIO - LIGNINSOLFONATO

- Evita il disseccamento del rachide nella **vite** e la filloptosi del **melo**.
- Migliora la risposta produttiva grazie all'ottimizzazione della fotosintesi clorofilliana.
- Aumenta la colorazione di **frutta e ortaggi**.
- Migliora il livello qualitativo della produzione **vitivinicola**.



 Applicazione sulla pianta

 Dose media d'impiego

CARATTERISTICHE

AXIMaG è un formulato espressamente studiato per prevenire e curare le fisiopatie causate da carenza di **Magnesio** negli ortaggi, nella frutta e nell'uva. Una carenza di Magnesio nella pianta si manifesta con un ingiallimento (clorosi) delle foglie più vecchie (basali) e la loro caduta anticipata, ridotto sviluppo per scarsa fotosintesi clorofilliana, limitata colorazione degli ortaggi, ad esempio delle carote, per la mancata formazione dei pigmenti coloranti. AXIMaG, grazie all'innovativa "**Complessazione naturale**" (8% MgO-LSA), viene assorbito totalmente e, raggiunge rapidamente i siti di utilizzo e agisce direttamente su foglie e sui frutti.

COMPOSIZIONE

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) TOTALE	8,0%
OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) IN FORMA DI COMPLESSO	8,0%
AGENTE COMPLESSANTE: (ligninsolfonato di ammonio) LSA	

CLASSIFICAZIONE

CLP	-
-----	---

FORMULAZIONE

Microgranuli idrosolubili (WDG) - colore marrone chiaro

CONFEZIONI

Astuccio: kg 1
(contiene sacchetto trasparente con trattamento di protezione UV)

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso.

COLTURE

PERIODO APPLICAZIONE

DOSE

COLTURE	PERIODO APPLICAZIONE	DOSE
VITE E UVA DA TAVOLA	2 applicazioni: a "scamicatura" e dopo 8-10 giorni. 2 applicazioni: 15 prima dell'inviatura e a inizio invaiatura	1,2-1,5 kg/Ha
MELO var. gialle (Golden e simili)	3-4 applicazioni da inizio giugno, ogni 10-12 giorni	1,0-1,2 kg/Ha
MELO var. rosse (es. Gala)	3-4 applicazioni da inizio giugno, ogni 10-12 giorni	1,0-1,5 kg/Ha
PESCO E DRUPACEE	2-3 applicazioni da "frutto noce", ripetere ogni 8 giorni	1,0-1,2 kg/Ha
ACTINIDIA E PIANTE DA FRUTTO	2-3 applicazioni da "frutto noce", ripetere ogni 8 giorni	1,0-1,5 kg/Ha
OLIVO	2-3 applicazioni da frutto allegato, ogni 10 giorni	1,2-1,5 kg/Ha
AGRUMI	2-3 applicazioni da post- allegazione, ogni 10 giorni	1,0-1,2 kg/Ha
COLTURE ESTENSIVE E INDUSTRIALI	2-3 applicazioni a partire dalle fasi iniziali di sviluppo	0,7-1,0 kg/Ha
POMODORO, PEPERONE ECC.	2-3 applicazioni, da ingrossamento frutti del 1° palco, ogni 10-12 gg	1,0-1,2 kg/Ha
LATTUGHE E ORTAGGI DA FOGLIA	2-3 applicazioni da piante sviluppate ogni 7-8 giorni	1,2-1,5 kg/Ha
ORTAGGI IN GENERE	2-3 applicazioni da frutto formato, ogni 8 giorni	1,0-1,5 kg/Ha
FRAGOLE	2-3 applicazioni da frutto formato, ogni 8-10 giorni	1,0-1,2 kg/Ha
GAROFANO E CRISANTEMO	3 applicazioni, dalle fasi iniziali fino alla formazione dei boccioli	80-100 g/hl
FLORICOLE E ORNAMENTALI IN GENERE	2-3 applicazioni, dalle fasi iniziali, fino alla formazione dei boccioli	70-100 g/hl