



AXIMICRO SC

new

AXIMICRO SC
CONCIME MINERALE LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI
PFC 1(C)(II)(B): B-Fe-Mn-Mo-Zn (0.8%-5%-2%-0.15%-1%) IN SOSPENSIONE

- Microelementi micronizzati formulati in sospensione concentrata
- Apparato fogliare altamente attivo.
- Previene e cura la clorosi ferrica.
- Equilibrio Ferro Manganese per ottimizzare la fotosintesi clorofilliana.
- Attiva i tessuti meristematici grazie a Boro, Molibdeno e Zinco.
- Favorisce i processi biochimici della pianta.



Applicazione
sulla pianta

1,5
ml/hl

Dose media
d'impiego

CARATTERISTICHE

AXIMICRO SC è un concime fogliare formulato in sospensione concentrata espressamente studiato per prevenire e curare le fisiopatie causate da carenze multiple di microelementi negli ortaggi, piante da frutto, olivo, vite e ornamentali. Le carenze multiple, causate dalla presenza ridotta di più elementi nutritivi o da antagonismo indiretto tra i microelementi, sono di difficile diagnosi; spesso si manifestano con ingiallimenti intervallari delle foglie, disseccamento dei lembi, sviluppo ridotto della vegetazione, riduzione della produzione e minori caratteristiche organolettiche. AXIMICRO SC apporta alle piante tutti i principali microelementi (ferro, manganese, zinco, boro, molibdeno) in forma altamente disponibile e in un rapporto appropriato per le piante. AXIMICRO SC, grazie alla purezza dei suoi componenti e alla presenza di specifici coformulanti ad azione chelante consente un più facile assorbimento e un pronto trasferimento degli elementi all'interno dei tessuti trattati. Il movimento e la penetrazione all'interno della pianta sono garantiti anche dall'altissima micronizzazione delle componenti minerali che porta alla formazione di particelle finissime capaci di valicare facilmente la parete fogliare ed essere poi agilmente trasportate dalla pianta.



COMPOSIZIONE

Boro (B) nella forma di borato idrato di calcio, idrosolubile	0,8%	10 g/l
FERRO (Fe) chelato con EDTA, stabile nell'intervallo di pH 4-7, idrosolubile	5%	70 g/l
MANGANESE (Mn) chelato con EDTA, stabile nell'intervallo di pH 6-10, idrosolubile	2%	30 g/l
MOLIBDENO (Mo) nella forma di ammonio molibdato, idrosolubile	0,15%	2 g/l
ZINCO (Zn) chelato con EDTA, stabile nell'intervallo di pH 6,5-10, idrosolubile	1%	15 g/l



CLASSIFICAZIONE

CLP --



FORMULAZIONE

Sospensione concentrata, colore marrone.



CONFEZIONI

Flaconi: L 1 = 1,3-1,4 g/mL



MISCIBILITA' E AVVERTENZE

AXIMICRO SC è miscibile con tutti i concimi fogliari e i fitofarmaci, salvo i prodotti a reazione alcalina e gli olii. Leggere l'etichetta prima dell'uso.



COLTURE



PERIODO APPLICAZIONE



DOSE*

Applicazione fogliare

VITE E UVA DA TAVOLA	2-4 applicazioni da ripresa vegetativa, ogni 8-12 giorni	1 - 2 L/ha	*Riferite a volumi d'irrigazione consigliati di 1000 l/ha.
MELO e PERO	2-4 applicazioni da ripresa vegetativa, ogni 8-12 giorni	1 - 2 L/ha	
PESCO e DRUPACEE	2-3 applicazioni da "frutto noce", ripetere ogni 8 giorni	1 - 2 L/ha	
ACTINIDIA E PIANTE DA FRUTTO IN GENERE	2-4 applicazioni da ripresa vegetativa, ogni 8-12 giorni	1 - 2 L/ha	
OLIVO	2-3 applicazioni da frutto allegato, ogni 10 giorni	1 - 2 L/ha	
AGRUMI	2-3 applicazioni da ripresa vegetativa, ogni 8-12 giorni	1 - 2 L/ha	Su Pesche ed Actinidia non trattare dopo metà ingrossamento frutto.
COLTURE ESTENSIVE E INDUSTRIALI	1-2 applicazioni a partire dalle fasi iniziali di sviluppo	1 - 2 L/ha	
POMODORO, PEPERONE, MELANZANA,	2-3 applicazioni da ingrossamento frutti del 1° palco, ripetendo ogni 10-12 giorni	1 - 2 L/ha	
LATTUGHE e ORTAGGI DA FOGLIA	2-3 applicazioni da piante sviluppate ogni 7-8 giorni	1 - 2 L/ha	
ORTAGGI IN GENERE	2-3 applicazioni da ripresa vegetativa, ogni 8-12 giorni	1 - 2 L/ha	
FRAGOLE	2-3 applicazioni da frutto formato, ogni 8-10 giorni	1 - 2 L/ha	
ARBUSTI e VIVAISMO	2-3 applicazioni da ripresa vegetativa, ogni 8-12 giorni	1 - 2 L/ha	
FLORICOLE e ORNAMENTALI in genere	1-2 applicazioni nelle fasi iniziali. Non applicare dopo la bocciatura.	1 - 2 L/ha	