



FITOSTIM® ALGA

CONCIME ORGANICO AZOTATO FLUIDO
ESTRATTO FLUIDO DI LIEVITO CONTENENTE ALGHE BRUNE

- Migliora i risultati quanti-qualitativi in **viticoltura, frutticoltura e orticoltura**.
- Attiva i processi collegati alla fotosintesi clorofilliana.
- Aumenta la potenzialità produttiva.
- Favorisce la formazione di germogli e di radici assorbenti.



 Applicazione sulla pianta

1-1,5 kg/Ha Dose media d'impiego

CARATTERISTICHE

FITOSTIM® ALGA è una specialità fogliare appositamente studiata per favorire lo sviluppo vegeto-produttivo di tutte le colture agricole. L'apporto di Azoto organico, ricco in aminoacidi vegetali, oltre ad offrire un'azione nutriente, agisce sui processi fisiologici della pianta e ne migliora le prestazioni biochimiche. Inoltre, grazie alle alghe marine brune (*Ascophyllum Nodosum*) che sono ricche di BETAINE, vitamine, promotori naturali, polisaccaridi e oligoelementi, le piante saranno **maggiormente resistenti a stress** atmosferici (es. sbalzi termici) e/o fisiologici (es. cascola dei frutti, microcarenze indotte).

COMPOSIZIONE

AZOTO (N) ORGANICO	2,0%
CARBONIO ORGANICO (C) di origine biologica	10,0%
pH	7,5-8,5
Sostanza Organica con peso molecolare nominale <50 kDa	50%

CLASSIFICAZIONE

CLP	-
-----	---

FORMULAZIONE

Liquido opalescente - Colore bruno

CONFEZIONI

Flacone: kg 1
Tanica: kg 10
Bancale: kg 1000

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso.

COLTURE

PERIODO APPLICAZIONE

DOSE

NOTE

COLTURE	PERIODO APPLICAZIONE	DOSE	NOTE
VITE E UVA DA TAVOLA	A partire da tralcio 10 cm, ogni 15-20 giorni.	2,5-3,0 kg/Ha	VOLUMI D'IRRORAZIONE CONSIGLIATI: 1000 l/Ha per piante da frutto e ortaggi; 500 l/Ha per cereali e colture industriali.
MELO E PERO	Dalla ripresa vegetativa, ogni 10-15 giorni.	2,0-3,0 kg/Ha	
PESCO E DRUPACEE	A partire da scamicatura, ogni 10-15 giorni.	2,0-3,0 kg/Ha	
ACTINIDIA E PIANTE DA FRUTTO IN GENERE	Dalla ripresa vegetativa, ogni 10-15 giorni.	2,5-3,0 kg/Ha	FERTIRRIGAZIONE, come sinergizzante ai concimi minerali: 1-2 kg/1000 mq.
OLIVO	Dalla ripresa vegetativa ogni 10-20 giorni.	2,0-3,0 kg/Ha	
AGRUMI	Dalla ripresa vegetativa, ogni 10-20 giorni.	2,5-3,5 kg/Ha	
ORTAGGI DA FRUTTO	Per tutto il ciclo colturale, ogni 10-15 giorni	2,5-3,0 kg/Ha	
ORTAGGI DA FOGLIA	Dalle fasi iniziali, ogni 10-15 giorni	2,0-3,0 kg/Ha	
COLTURE INDUSTRIALI E OLEAGINOSE	Nella fase di formazione e accumulo delle sostanze zuccherine/oleaginose.	2,5-3,0 kg/Ha	
CEREALI	Applicazioni nella fase di botticella.	2,0-3,0 kg/Ha	
FLORICOLE E ORNAMENTALI IN GENERE	Dalle fasi iniziali fino alla formazione dei boccioli, NON USARE SU PETALI VISIBILI	100-150 g/hl	

N.B.: In abbinamento ai trattamenti fogliari la dose consigliata è 1 kg/Ha