



FRUTTAFLOR® 20-20-20

CONCIME MINERALE SOLIDO A BASE DI MACROELEMENTI
PFC 1 (C)(I)(a)(ii) - Concime NPK con B + Fe + Mn + Zn
20.20.20 + 0,01 + 0,2 + 0,1 + 0,01

- Rivitalizza la fertilità nei terreni molto sfruttati e "stanchi".
- Crea condizioni sfavorevoli per la diffusione di una ampia serie di funghi e batteri capaci di nuocere allo sviluppo delle piante.
- Efficace nelle fasi giovanili o di crescita delle colture.

CARATTERISTICHE

FRUTTAFLOR® 20-20-20 è un concime specifico per applicazioni fogliari utilizzabile durante tutte le fasi del ciclo colturale. Grazie alla elevata purezza delle materie prime risulta altamente solubile e totalmente assimilabile dalle piante. È caratterizzato da un rapporto NPK (1-1-1) per consentire un equilibrato sviluppo vegeto-produttivo e migliorare le caratteristiche di frutta, ortaggi e floricole. Arricchito con microelementi chelati per prevenire manifestazioni carenziali che potrebbero compromettere il raccolto.



- Applicazione sulla pianta
- 2 kg/Ha Dose media d'impiego

COMPOSIZIONE

AZOTO (N) Totale	20,0%
di cui: Azoto nitrico 6,0% - Azoto ammoniacale 4,0% - Azoto ureico 10,0%	
ANIDRIDE FOSFORICA (P ₂ O ₅) idrosolubile	20,0%
OSSIDO DI POTASSIO (K ₂ O) idrosolubile	20,0%
BORO (B), nella forma di Ottoborato di Potassio, idrosolubile	0,01%
FERRO (Fe) chelato con EDTA, idrosolubile	0,2%
MANGANESE (Mn) chelato con EDTA, idrosolubile	0,1%
ZINCO (Zn) chelato con EDTA, idrosolubile	0,01%
Ferro, Manganese e Zinco sono chelati con EDTA (Acido Etilendiamminotetracetico). I chelati di EDTA sono stabili ai seguenti intervalli di pH: Fe EDTA 4-7; Mn EDTA 6-10; Zn EDTA 6,5-10.	

FORMULAZIONE

Polvere solubile

CONFEZIONI

Sacchetto: kg 2

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso.

CLASSIFICAZIONE

CLP

-

COLTURE

PERIODO APPLICAZIONE

DOSE

VITE DA VINO	Da pre-fioritura alla raccolta.	TRATTAMENTI FOGLIARI: dose di 200-250 g/hl, ogni 10-15 giorni. Il dosaggio è riferito per volumi d'acqua cosiddetti "normali" di 1000 litri/Ha. Sono consigliati 2-4 interventi durante il ciclo, da modulare e/o aumentare con sviluppi e/o andamento stagionale avverso. Intervenire nelle ore fresche. In abbinamento al diserbo con le microdosi (MDR) non superare 0.5 kg/Ha. Utilizzare dosaggi minori del 30% per le colture sotto serra o tunnel.
VITE DA TAVOLA	Da fine allegagione a raccolta.	
MELO E PERO	Da caduta petali a invaiatura.	
ACTINIDIA	Da post-fioritura alla raccolta.	
AGRUMI	Da allegagione alla raccolta.	
OLIVO	Da pre-fioritura alla raccolta.	
FRAGOLA	Da pre-fioritura alla raccolta.	
POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLO, ZUCCHINO	Da inizio allegagione alla raccolta.	
MELONE, COCOMERO	Da pre-fioritura alla raccolta.	
PATATA	Da post-fioritura a raccolta.	
ORTAGGI A FOGLIA	A partire dalle prime fasi di sviluppo.	
ORTAGGI IN GENERE	Dalle prime fasi alla raccolta.	
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, COLTURE INDUSTRIALI E DA SEME	Da pieno sviluppo fogliare a raccolta.	
FLORICOLE E ORNAMENTALI	Applicazioni ripetute durante la fase vegetativa. Non trattare con petali visibili.	
TAPPETI ERBOSI	applicare periodicamente da marzo all'autunno.	