



Prodotto speciale a base di Calcio e Magnesio, complessati con lignin-solfonato

Prodotto speciale contenente Calcio e Magnesio con agente complessante lignin-solfonato

Maxito® è un integratore liquido, a base di un complesso di lignin-solfonato di calcio e magnesio, caratterizzato da un ottimo assorbimento da parte delle foglie.

I lignin-solfonati sono stabili sia a pH alcalino che acido; non sono fotolabili e conferiscono pronta assimilazione degli elementi.

Una scelta vincente

Aumenta l'attività di assorbimento e traslocazione degli elaborati. Migliora l'allegagione, favorisce l'ingrossamento dei frutti. Migliora le caratteristiche organolettiche. Forte azione energetica, riduce gli stress (grandine, gelo, alte temperature).

Composizione

Cloruro di Calcio complessato con ligninsolfonato di ammonio **7%**
Cloruro di Magnesio complessato con ligninsolfonato di ammonio **2,5%**

Peso specifico

1,30

Formulazione

Liquido

Confezioni



5 kg (collo da n° 4 pz.)



ATTENZIONE

Consigli d'impiego

Colture	Epoca d'impiego	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	Note
Vite	Da ingrossamento dell'acino alla invaiatura, 4 interventi, ogni 10-12 gg.	250-350	2,5-3,5	Contro il "disseccamento del rachide". Attiva la fotosintesi.
Pomacee	Dall'allegagione, ogni 10-12 gg., per 4-6 interventi.	250-350	2,5-3,5	Previene la "butteratura amara". Evita la caduta anticipata delle foglie.
Drupacee	Da frutto noce, ogni 10-20 gg., per 3-4 interventi.	250-300	2,5-3	Previene la spaccatura dei frutti, la lenticellosi, aumenta la consistenza e conservabilità. Previene il "mal raggiante" delle nettarine.
Kiwi	3 trattamenti ogni 10 gg., da ingrossamento frutto in poi.	250-300	2,5-3	Aumenta la consistenza, la allegagione, conservabilità e la sapidità dei frutti.
Fragola	3 interventi: prefioritura, dopo 8-10 gg.	250-300	2,5-3	
Melone e Cocomero	Da frutto formato, ogni 10-12 gg., per 3 interventi.	250-300	2,5-3	Previene il seccume fisiologico dei frutti.
Melanzana	Da frutto formato, ogni 10-12 giorni, per 3 applicazioni.	250-300	2,5-3	Riduce o evita la "striatura del frutto".
Insalate	Subito dopo la crisi di trapianto, 2-3 applicazioni.	250-300	2,5-3	Riduce il seccume delle foglie.
Pomodoro, Peperone	Dall'allegagione del primo palco, ogni 10-15 gg.	250-300	2,5-3	Evita il "marciume apicale" del pomodoro e favorisce la consistenza del peperone.
Zucchini	Da inizio formazione frutti, ogni 10-12 gg.	250-300	2,5-3	Migliora le caratteristiche qualitative in zone o cultivar con problemi di calcio-carenza.
Fiori, Ornamentali	Durante le fasi iniziali o al manifestarsi dei primi sintomi, 2 applicazioni.	200-250	2-2,5	Migliora lo stato fitosanitario di piante e fiori, colori più intensi. Foglie più lisce e consistenti.

Maxito® si impiega anche in fertirrigazione a dosi di 5-10 kg/1000 m².

Miscibilità

Evitare miscele con prodotti alcalini/rameici o a base oleosa e distanziare di almeno 10 giorni eventuali applicazioni con tali prodotti. Escludendo le classi di prodotti sopracitati il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati pur tuttavia è sempre consigliabile effettuare piccoli saggi per verificare la compatibilità e eventuali sensibilità varietali.

Avvertenze

Effettuare le applicazioni nelle ore più fresche della giornata. Agitare bene prima dell'uso. In ambiente protetto (serre, tunnels, ecc.) ridurre opportunamente le dosi di impiego del 20-30%. Conservare in luogo fresco ed asciutto.