



Composizione

Carfentrazone-etile (60 g/L) **6,45%**

Formulazione

Emulsione acqua/olio

Confezioni

1 L (collo da n° 12 pz.)



Registrazione

n° 15180 del 13.06.2011



ATTENZIONE

Erbicida ad azione diserbante, spollonante e per il disseccamento pre-raccolta della patata

Platform[®] Plus è un erbicida di contatto (non ha attività sistemica o residuale) appartenente alla famiglia chimica dei triazolinoni (classificazione HRAC gruppo 14, ex gruppo E).

Viene assorbito rapidamente dalle parti di pianta trattate (mediamente entro 2 ore dall'applicazione). Agisce con effetto dissecante per inibizione dell'enzima protoporfirinogeno-ossidasi (PPO) e provoca l'arresto della fotosintesi con produzione di composti ossidanti e distruzione delle membrane cellulari.

Una scelta vincente

Diverse possibilità d'impiego. Possibilità d'utilizzo anche in vivaio. Ottima efficacia erbicida su diverse infestanti (es. Convolvolo). Efficace su Coniza allo stato di rosetta. Soluzione ideale sia in miscela con Glifosate che per miscele in sostituzione del Glifosate.

Modalità d'impiego

Colture	Dosi (L/hl)	Dosi (L/ha)	Epoche d'impiego	Periodo carenza
AZIONE DISERBANTE				
Integra o rende più rapida l'azione di erbicidi totali, sistemici o di contatto applicati in miscela, nei confronti di infestanti quali Vilucchio (<i>Convolvulus arvensis</i>), Malva (<i>Malva sylvestris</i>), Porcellana (<i>Portulaca oleracea</i>), Acetosella (<i>Oxalis spp.</i>), Piantaggine (<i>Plantago maior</i>), Erba morella (<i>Solanum nigrum</i>), Ortica (<i>Urtica dioica</i>).				
Vite, Nocciolo, Melo, Pero, Pesco, Susino, Kiwi, Agrumi, Olivo	-	0,3	Impiegare nei trattamenti autunnali contro le graminacee e dicotiledoni autunnali e le nascite delle principali infestanti invernali, in 300-500 litri d'acqua, oppure nei trattamenti primaverili. La dose può essere ridotta a 0,25 l/ha qualora siano attuati più trattamenti per un adeguato controllo delle eventuali rinascite delle infestanti. Su Olivo, per la pulizia delle piazzole, intervenire una settimana prima della raccolta.	7 gg.
Diserbo totale degli incolti (Aree industriali e civili, bordi stradali, argini e sedi ferroviarie)	-	0,3	Impiegare in miscela con erbicidi sistemici.	-
Vivai di piante arbustive ed arboree	-	0,3	Impiegare in 300-500 litri d'acqua per ettaro	-
CONTROLLO DEI POLLONI				
Localizzare il trattamento sulla zona dei polloni utilizzando barre schermate per evitare che la deriva della soluzione raggiunga la vegetazione circostante della coltura.				
Vite	0,3	-	Applicare 0,8-1 L di soluzione acquosa per 10 metri lineari pari a 80-100 litri di soluzione per km percorso.	7 gg.
Nocciolo	0,35-0,4	1		7 gg.
Melo, Pero, Pesco, Susino, Kiwi, Agrumi, Olivo	0,3	0,9-1		7 gg.
DISSECCANTE PRE-RACCOLTA DELLA PATATA				
Utilizzare in pre-raccolta, quale dissecante della vegetazione. Il prodotto agisce per contatto e non lascia residui sui tuberi.				
Patata per uso alimentare, Patate utilizzate per la produzione della fecola, Patate da seme	-	1	Applicare il prodotto alla completa maturazione dei tuberi e ad inizio del processo di senescenza della coltura, con volumi di 300-600 litri di acqua ad ettaro (in casi eccezionali, potrebbe essere necessario eseguire una seconda applicazione, alla stessa dose 5-7 giorni dopo la prima). Qualora sia stato eseguito un intervento di frantumazione meccanica della vegetazione (steli della lunghezza di 10-15 cm), trattare 2-4 giorni dopo.	3 gg.

Compatibilità

Il prodotto è normalmente utilizzato in miscela con erbicidi totali, sistemici o di contatto che ne completano lo spettro d'azione.

Avvertenze

Bagnare bene la vegetazione da eliminare. La qualità dell'attività di disseccamento dipende dalla accuratezza e uniformità con cui viene realizzata l'applicazione. Verificare il buon funzionamento della barra irroratrice e assicurarsi che la velocità di avanzamento del trattore e la pressione della pompa permettano una elevata penetrazione del prodotto nella vegetazione.

Utilizzare esclusivamente ugelli antideriva e, in generale, prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare che una accidentale deriva del prodotto finisca sulle colture limitrofe.

Applicare il prodotto preferibilmente al mattino anche in presenza di vegetazione leggermente umida.

Sulla patata, per ottenere un'attività dissecante ottimale, evitare l'applicazione in condizioni climatiche estreme (es. siccità o umidità eccessiva, temperature elevate ed umidità dell'aria molto bassa).

Agrofarmaco autorizzato dal Min. della Salute. Le informazioni sopraindicate sono indicative e parziali, prima dell'uso leggere sempre l'etichetta sul prodotto, con particolare attenzione alle frasi e simboli di pericolo.

Platform[®] Plus: marchio FMC Corporation o di sue società affiliate.