



Targa[®] FLO

Composizione

Quizalofop-p-etile (50 g/l) **4,9%**

Formulazione

Sospensione concentrata

Confezioni



1 L (collo da n° 12 pz.)

5 L (collo da n° 4 pz.)

Registrazione

n° 6956 del 05.02.1987



ATTENZIONE

Erbicida selettivo, efficace contro le infestanti graminacee

Targa® Flo è un erbicida selettivo per il diserbo di post-emergenza delle colture, contro le infestanti graminacee annuali e poliennali.

Il prodotto va applicato sulle infestanti già emerse, che vengono distrutte per azione di contatto e di assorbimento fogliare.

Una scelta vincente

Elevata attività erbicida. Selettivo per le colture autorizzate.

Modalità d'impiego

Colture	Epoche d'impiego	Periodo carenza	Dosi
Patata	dalla comparsa delle prime foglie fino alla fine della fioritura	45 gg.	INFESTANTI ANNUALI: 1 - 1,5 l/ha La dose minore è da impiegare su graminacee nello stadio di 1 - 3 foglie, la dose maggiore è indicata dallo stadio di accostamento in poi.
Pomodoro	dalla comparsa delle prime foglie fino a termine allegagione	21 gg.	
Carota	dalla emissione della prima foglia fino a prima della raccolta	21 gg.	
Barbabietola da zucchero	dalla emissione del III° paio di foglie fino a prima della raccolta	60 gg.	INFESTANTI POLIENNALI: 1,5 - 3 l/ha Per combattere infestazioni di <i>Sorghum halepense</i> da rizoma si può intervenire con: - trattamento frazionato a 1 l/ha su infestante a 20-30 cm di altezza, seguito da 1,5 l/ha sui ricacci dell'infestante; - trattamento unico a 2,5 l/ha su infestante in fase di levata-inizio botticella. Per trattamenti su Girasole non superare la dose massima di 1,5 l/ha.
Cotone	dalla emissione delle prime foglie fino alla fase di capsule mature	45 gg.	
Colza	dalla emissione delle prime foglie fino alla piena fioritura	90 gg.	
Soia	dalla comparsa delle prime foglie fino ad inizio allegagione	90 gg.	
Girasole	dalla emissione delle prime foglie alla maturazione dei primi semi dell'infiorescenza	45 gg.	
Fagioli freschi con baccello	dalla emissione delle prime foglie fino allo sviluppo dei baccelli	21 gg.	
Piselli freschi senza baccello	dalla emissione delle prime foglie fino al disseccamento dei baccelli	21 gg.	
Leguminose da granella	dalla comparsa delle prime foglie ai baccelli completamente formati	45 gg.	

Effettuare un solo trattamento all'anno.

Per le colture da seme utilizzare il prodotto entro l'inizio della fioritura.

Infestanti sensibili

GRAMINACEE ANNUALI: Avena selvatica (*Avena fatua*), Coda di topo (*Alopecurus myosuroides*), Digitaria (*Digitaria sanguinalis*), Falso panico (*Setaria viridis*), Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), Loglio (*Lolium spp.*).

GRAMINACEE POLIENNALI: Falsa gramigna (*Agropyron repens*), Gramigna comune (*Cynodon dactylon*), Sorghetta (*Sorghum halepense*).

Fitotossicità

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Trattare in assenza di vento in modo da non danneggiare colture sensibili vicine.

Gestione delle resistenze

Per evitare l'insorgenza di fenomeni di resistenza alternare prodotti con meccanismi d'azione differenti.

Avvertenze

Occorrono 7-15 giorni, in relazione all'andamento stagionale, per manifestare l'effetto erbicida.

Le condizioni climatiche favorevoli alla crescita vegetativa delle infestanti (caldo e buon livello di umidità del terreno) migliorano ed accelerano l'efficacia del prodotto.

Per quanto concerne le infestanti perennanti, la frammentazione dei rizomi effettuata con lavorazioni meccaniche migliora l'efficacia del trattamento.

È consigliato l'utilizzo di un agente anti-schiuma qualora si formi una quantità eccessiva di schiuma nel serbatoio.

Il prodotto è stabile per 2 anni se conservato nel suo contenitore sigillato.

Agrofarmaco autorizzato dal Min. della Salute. Le informazioni sopraindicate sono indicative e parziali, prima dell'uso leggere sempre l'etichetta sul prodotto, con particolare attenzione alle frasi e simboli di pericolo.

Targa® Flo: marchio registrato e prodotto originale Nissan.