



Composizione

Zolfo (800 g/l) **56,09%**
(esente da selenio)

Formulazione

Sospensione concentrata

Confezioni



1 L (collo da n° 10 pz.)
10 L

Registrazione

n° 17808 del 27.01.2021

Nessun pittogramma CLP

Antene® S



Fungicida antioidico in sospensione concentrata

Antene® S è una sospensione concentrata a base di zolfo caratterizzato da una pronta e facile dispersibilità in acqua durante la preparazione della miscela. Il processo di formulazione consente di ottenere la più appropriata distribuzione granulometrica, al fine di assicurare la migliore e più corretta copertura della vegetazione trattata. La formulazione flowable conferisce caratteristiche di elevata adesività, resistenza al dilavamento e adeguata persistenza.

Una scelta vincente

Formulazione liquida, con particelle finemente micronizzate, di elevata stabilità e distribuzione omogenea nella dispersione. Formulazione a base acqua, inodore, che non contiene solventi e garantisce elevata disperdibilità in botte ed un'uniforme copertura della vegetazione trattata. Grazie alla presenza di un surfattante specifico è dotato di ottima miscibilità, adesività e persistenza anche a seguito di diverse bagnature. Agisce attivamente verso tutte le forme di oidio con meccanismo aspecifico, risultando il partner ideale delle molecole ad azione monosito.

Modalità d'impiego

Colture	Avversità	Dosi (L/ha)	Note	N° max tratt./anno	Periodo carenza
Vite	Oidio	3-4	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi	8	5 gg.
Pomacee	Ticchiolatura, Oidio, Eriofidi	3-4	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi	8	5 gg.
Drupacee	Oidio, Bolla	3-4	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi	8	5 gg.
Nocciolo	Oidio, Eriofidi	3-4	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi	8	5 gg.
Pomodoro e altri ortaggi a frutto: Solanacee, Cucurbitacee con buccia commestibile e non commestibile (in pieno campo e serra)	Oidio	2	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi	6	3 gg.
Cavoli, Ortaggi a stelo (in campo)	Oidio	2	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi	6	3 gg.
Legumi freschi e da granella (in campo)	Oidio	2	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi	6	3 gg.
Floreali ed Ornamentali (in pieno campo e serra), Forestali	Oidio	3	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi	5	-
Cereali	Oidio	8-10	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi.	4	5 gg.

Compatibilità

Il prodotto non è compatibile con prodotti fitosanitari alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.), con oli minerali, con Captano e prodotti contenenti solventi organici di origine vegetale.

Fitotossicità

Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano. Al fine di prevenire effetti dannosi alle colture trattate (scottature) e per proteggere le piante non bersaglio, non applicare il prodotto quando le temperature superano i 30°C. Può essere dannoso sulle cultivar di melo: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvillia bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome beauty, Stayman red, Winesap; pero: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio; e sulle cucurbitacee. Su floreali e ornamentali o varietà di nuova introduzione effettuare saggi preliminari prima dell'impiego.

Avvertenze

Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare Antene® ad altri fungicidi.

Agrofarmaco autorizzato dal Min. della Salute. Le informazioni soprariportate sono indicative e parziali, prima dell'uso leggere sempre l'etichetta sul prodotto, con particolare attenzione alle frasi e simboli di pericolo.