



Composizione

Tetraconazolo (125 g/l) **11,6%**

Formulazione

Microemulsione

Confezioni



0,25 L (collo da n° 20 pz.)
1 L (collo da n° 12 pz.)

Registrazione

n° 17826 del 20.04.2021



Fungicida sistemico in microemulsione ad ampio spettro d'azione

Domark[®] 125 Plus è un fungicida sistemico a base di *tetraconazolo*, principio attivo dotato di elevata efficacia ed ampio spettro d'azione.

Consente di ottenere il massimo della protezione con la più ampia elasticità d'impiego in trattamenti di tipo sia preventivo che curativo. Può essere applicato ai diversi stadi della coltura, da solo o in miscela con altri prodotti, in funzione del programma di trattamenti adottato.

Una scelta vincente

Elevata attività sistemica. Efficacia prolungata. Ampio spettro d'azione. Import tolerance USA. Ottima efficacia collaterale su Black-Rot (marciume nero) della vite. Nuova formulazione ad elevata attività e sicura per l'operatore.

Modalità d'impiego

Colture	Avversità	Dosi (ml/hl)	Dosi (ml/ha)	Note	Periodo carenza
Vite	Oidio	20-25	240	2-3 trattamenti in pre e postfioritura distanziati di 12-14 giorni. Attività collaterale contro <i>Guignardia bidwelli</i> (Marciume nero).	30 gg.
Melo, Pero	Ticchiolatura	24	240	Trattare ogni 7 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione primaria e fino alla fase di frutto noce; proseguire successivamente con intervalli di 10 giorni fra ciascuna applicazione. Trattamenti curativi: intervenire entro le 72-96 ore successive alla pioggia infettante. Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): eseguire 2 trattamenti a distanza di 5-7 giorni e quindi proseguire con le cadenze normali. Si consiglia l'impiego in miscela con un prodotto di copertura.	14 gg.
Melo	Oidio	16-24	190-240	2-3 trattamenti primaverili ed estivi distanziati di 12-14 giorni.	14 gg.
Pesco, Albicocco	Oidio	30	300	3 trattamenti a partire dalla caduta dei petali ripetendo le irrorazioni ad intervalli di 12-14 giorni nelle aree ad elevata pressione di infezione e in presenza di varietà particolarmente sensibili. Dove l'incidenza della malattia è minore intervenire ogni 14-21 giorni.	14 gg.
Melone, Cocomero Cetriolo*, Zucchini* (in campo e serra)	Oidio	50	400	Alla comparsa dei primi sintomi della malattia eseguire 2-3 trattamenti distanziati di 10-15 giorni.	7 gg. *3 gg.
Carciofo (in campo e serra)	Oidio	20-30	200-300	2-3 trattamenti. Trattare alla prima comparsa della malattia ripetendo le applicazioni ogni 15 giorni se necessario.	3 gg.
Peperone, Pomodoro e Melanzana (in campo)	Oidio	20-36	200-360	Alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione eseguire 2-3 trattamenti ogni 8-12 giorni.	7 gg.
	Cladosporiosi	40-60	400-600	In caso di applicazioni curative ridurre l'intervallo a 8-10 giorni.	
Cereali (Frumento, Orzo)	Oidio, Ruggini, Septoriosi, Rincosporiosi	-	900-1000	Eseguire i trattamenti in via preventiva quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni utilizzando un volume d'acqua di 200-600 l/ha. Si devono di norma effettuare due applicazioni, rispettivamente allo stadio di 1-2 nodi ed all'inizio della spigatura, limitandosi ad una sola (in genere spigatura), in caso di minor pressione della malattia e sulle varietà meno sensibili.	Trattare fino a fine fioritura
Barbabietola da zucchero	Cercospora, Oidio, Ramularia, Ruggine	-	800	Utilizzare 400-600 l/ha di acqua. Effettuare il trattamento alla comparsa dei sintomi, da fine sviluppo fogliare alla fase di prefioritura.	14 gg.
COLTURE ORNAMENTALI E FLORICOLE (in serra, vivaio e pieno campo):					
Rosa	Oidio	20-40	-		
	Ruggine	40	-		
Crisantemo, Garofano	Ruggine	60-75	-		
Pelargonio (geranio), Gladiolo	Ruggine	75	-		

Compatibilità

Considerando l'esistenza di numerose varietà con sensibilità diversa, per le ornamentali è consigliabile effettuare saggi preliminari su un numero limitato di piante.

Agrofarmaco autorizzato dal Min. della Salute. Le informazioni sopriportate sono indicative e parziali, prima dell'uso leggere sempre l'etichetta sul prodotto, con particolare attenzione alle frasi e simboli di pericolo.

Domark[®] 125 Plus: marchio registrato e prodotto originale Gowan.