

Fungicida in sospensione concentrata

Genkotsu® è un fungicida ad attività penetrante e di contatto appartenente ad una nuova famiglia chimica, le sulfonamidi. Possiede una limitata attività curativa ma una notevole efficacia preventiva. Si caratterizza, inoltre, per la lunga persistenza d'azione. GENKOTSU è particolarmente efficace nei confronti dei funghi della classe Oomycetes, quali peronospora, pseudoperonospora, fitoftora, bremia, ecc.

Una scelta vincente

Ottima efficacia anche nelle prime fasi. Elevata persistenza d'azione. Prolungata resistenza al dilavamento. Strumento ideale per le strategie antiresistenza. Si combina perfettamente con altre soluzioni antiperonosporiche.



Composizione

Amisulbrom (200 g/l) **17,70%**

Formulazione

Sospensione concentrata

Confezioni

1 L (collo da n° 12 pz.)



Registrazione

n° 17211 del 12.04.2018



Modalità d'impiego (impiegabile solo in pieno campo)

Colture	Avversità	Dosi (ml/hl)	Dosi (L/ha)	Note	N° max tratt./anno	Periodo carenza
Vite	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	-	0,375	Effettuare i trattamenti in via preventiva associando alla miscela prodotti di copertura. Effettuare i trattamenti quando si verificano le condizioni di sviluppo del patogeno e proseguirli ad intervalli di 10 giorni in funzione dell'andamento stagionale e della pressione della malattia	3 (max 2 consecutivi)	28 gg.
Patata	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	50	0,5	Iniziare la difesa preventivamente, allorché si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, e proseguirla ad intervalli di 7-10 giorni in funzione dell'andamento stagionale e della pressione della malattia.	4*	7 gg.
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	60	0,6	Intervenire preventivamente, quando si instaurano condizioni favorevoli allo sviluppo del patogeno, e proseguendo la lotta ad intervalli di 7-10 giorni.	3*	3 gg.
Lattuga	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	60	0,6	Iniziare i trattamenti preventivamente quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo del fungo e proseguirli ad intervalli di circa 7 giorni.	3*	3 gg.

*N° massimo dei trattamenti con questo o altri prodotti aventi lo stesso meccanismo d'azione.

Compatibilità

Il prodotto risulta scarsamente compatibile con i preparati a reazione alcalina.

Agrofarmaco autorizzato dal Min. della Salute. Le informazioni sopri riportate sono indicative e parziali, prima dell'uso leggere sempre l'etichetta sul prodotto, con particolare attenzione alle frasi e simboli di pericolo.