



Composizione

Rame metallo **30%**
(10% da ossicloruro tetraramico e 20% da idrossido)

Formulazione

Granuli idrodispersibili

Confezioni

 **10 kg**

Registrazione

n° 17631 del 11.08.2020



Fungicida in granuli idrodispersibili a base di rame (1/3 ossicloruro e 2/3 idrossido)

Grifon[®] Extra è un anticrittogamico in granuli idrodispersibili a base di ossicloruro e idrossido di rame. È efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche.

Una scelta vincente

Eccellente efficacia fungicida con elevata prontezza e persistenza d'azione. Impiego di basse dosi di Rame metallo per ettaro. Formulazione tecnologica innovativa "Fluid Bed". Maggiore resistenza al dilavamento. Ottima selettività per la pianta. Partner ideale per altri fungicidi. Impiegabile anche in Agricoltura Biologica.

Modalità d'impiego

Culture	Avversità	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	Note	N° max tratt./anno	Periodo carenza
Vite	Peronospora, Marciume nero. Azione collaterale contro Escoriosi	100-150	1-1,5	Intervenire preventivamente (nel periodo compreso tra il germogliamento e l'invasatura) ripetendo i trattamenti ogni 7-8 giorni. Utilizzare la dose più alta nel caso di elevata pressione infettiva o condizioni atmosferiche particolarmente piovose. Su forme di allevamento espanse (come pergole, tendoni) non superare la dose di 2 kg/ha indipendentemente dai volumi d'acqua utilizzati.	10	21 gg.
Olivo	Cicloconio o occhio di pavone, Lebbra	150	Max 3	Intervenire in primavera e durante il periodo autunnale. I trattamenti contro l'occhio di pavone hanno effetto di contenimento anche su Fumaggine, Piombatura e Rogna.	4	14 gg.
Pomodoro da industria*, Pomodoro da consumo fresco**, Melanzana** (in pieno campo)	Peronospora e marciumi da batteriosi		1,5	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni (piogge, bagnature, elevata umidità) e ripeterli preferibilmente ogni 7-8 giorni.	6	*= 10 gg. **= 3 gg.

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

Compatibilità

Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, etc.) e quelli contenenti Thiram.

Fitotossicità

Non trattare durante la fioritura.

Avvertenze

Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea.

Agrofarmaco autorizzato dal Min. della Salute. Le informazioni soprariportate sono indicative e parziali, prima dell'uso leggere sempre l'etichetta sul prodotto, con particolare attenzione alle frasi e simboli di pericolo.