



Composizione

Rame metallo **37,5%**
(da ossicloruro tetraramico)

Formulazione

Granuli idrodispersibili

Confezioni



Registrazione

n° 10296 del 03.02.2000



ATTENZIONE

Iperion®



Fungicida a base di rame ossicloruro

Iperion® è un fungicida ad ampio spettro di azione contenente rame sotto forma di ossicloruro tetraramico. La formulazione in granuli idrodispersibili assicura la massima semplicità e sicurezza d'impiego.

Una scelta vincente

Tecnologia appositamente studiata per massimizzare l'adesione e migliorare la copertura fogliare su ogni coltura e durante tutta la stagione. L'elevata persistenza della formulazione, l'alto numero di colture in etichetta e la spiccata efficacia ad ampio spettro, lo rendono un prodotto estremamente flessibile. È ammesso in agricoltura biologica.

Modalità d'impiego

Culture	Avversità	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	Note	N° max tratt./anno	Periodo carenza
Vite	Peronospora	200-250	2-2,5	Da 3 foglie non ancora distese sino al tempo di carenza.	6	21 gg.
Agrumi: Arancio, Limone, Mandarino, Clementine, Bergamotto, Cedro, Pomelo, Limetta, Chinotto, Tangerino	Allupatura. Azione collaterale contro Antracnosi, Batteriosi, Fumaggini	250	Max 3,5	Da ingrossamento ovario sino al tempo di carenza.	4	14 gg.
Pomacee: Melo, Pero, Cotogno*	Ticchiolatura, Cancro rameale, Batteriosi, Colpo di fuoco	300	Max 3,5	Trattamenti autunno-invernali.	3	21 gg. *su Cotogno sospendere i trattamenti alla fioritura
		200	Max 2,5	Trattamenti da rottura gemme fino alla prefioritura.	4	
		130	1,3-2	Trattamenti dopo la fioritura contro la Ticchiolatura o interventi di soccorso contro Colpo di fuoco.	6	
Drupacee: Pesco, Albicocco, Nectarino, Percoche, Ciliegio, Susino, Mandorlo	Bolla, Moniliosi. Azione collaterale contro Batteriosi	270-300	Max 3,5	Da 50% di foglie cadute a 100% di foglie cadute.	2	Fino a bottoni fiorali
		200-250	2,5-3	Da apertura gemme ad apertura sepali.	2	
Frutti a guscio: Noce, Castagno, Nocciolo	Cancri rameali, Fersa del Castagno, Citospora del Nocciolo	200-250	2,5-3,8	Da post raccolta a gemme ferme. Trattare alla dose di 2,5 kg/ha. La dose può essere elevata sino a 3,8 kg/ha in caso di forti attacchi di batteriosi.	3	14 gg.
Olivo	Occhio di Pavone, Lebbra, Rogna. Azione collaterale contro Fumaggine, Piombatura.	200-250	2-3	Dallo sviluppo dei germogli fino ad inizio fioritura, e poi dallo sviluppo delle drupe fino a invaiatura. Utilizzare la dose più alta per la lotta alla lebbra e su varietà più sensibili alle malattie.	5	14 gg.
Pomodoro, Melanzana (in serra e pieno campo)	Peronospora, Marciume zonato, Alternaria, Batteriosi	300	2-2,5	Intervenire nella fase di sviluppo fogliare.	6	3 gg.

Colture	Avversità	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	Note	N° max tratt./anno	Periodo carenza
Patata (in pieno campo)	Peronospora, Batteriosi	300-450	2,5-2,7	Intervenire nella fase di sviluppo fogliare.	6	7 gg.
Aglione, Cipolla, Cipolline, Scalognone (in pieno campo)	Peronospora, Alternaria	300	2-2,5	Intervenire nella fase di sviluppo fogliare.	6	3 gg.
Melone, Cocomero, Zucca (in serra e pieno campo)	Peronospora, Maculatura angolare	300	2-2,5	Intervenire nella fase di sviluppo fogliare.	6	7 gg.
Zucchini, Cetriolo, Cetriolino (in serra e pieno campo)	Peronospora, Maculatura angolare	300	2-2,5	Intervenire nella fase di sviluppo fogliare.	6	3 gg.
Lattuga, Scarola, Indivia, Rucola, Valerianella (in campo)	Peronospora	300	2-2,5	Intervenire nella fase di sviluppo fogliare.	6	7 gg.
Carciofo (in campo)	Peronospora	300	2-2,5	Intervenire nella fase di sviluppo fogliare.	6	3 gg.
Cavolfiori, Broccoli (in campo)	Peronospora, Alternaria, Micosferella	300	2-2,5	Intervenire nella fase di sviluppo fogliare.	6	14 gg.
Fragola (in campo)	Vaiolatura, Maculatura angolare	300	Max 2,5	Dalla terza foglia all'invasatura.	5	3 gg.
Forestali: Cipresso	Cancro rameale	250	2,5-3,7	Tutti gli stadi vegetativi.	4	-

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo medio applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

Compatibilità

Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, etc.) e quelli contenenti Thiram.

Fitotossicità

Non trattare durante la fioritura.

Sulle varietà di melo e di pero sensibili al rame e qui elencate il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, commercio.

Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avanches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico.

Agrofarmaco autorizzato dal Min. della Salute. Le informazioni soprariportate sono indicative e parziali, prima dell'uso leggere sempre l'etichetta sul prodotto, con particolare attenzione alle frasi e simboli di pericolo.