

Nimbus 250 EC

- › FUNGICIDA SISTEMICO A BASE DI DIFENOCONAZOLO
- › AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA

COMPOSIZIONE
difenoconazolo 23,23%
(250 g/l)

CODICE FRAC
3

FORMULAZIONE
concentrato emulsionabile (EC)

BUFFER ZONE
Non previste

INDICAZIONI DI PERICOLO
CLP: H304; H319; H336; H410;
EUH066; EUH401



Pericolo

REG. MIN. SALUTE
n° 16793 del 25.07.2016

SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	MAX
Barbabietola da zucchero	Cercospora	0,2-0,3 l/ha	Trattamenti a cadenza di 15-20 gg	21 gg	3
Melo, Pero	Ticchiolatura, Oidio	15 ml/hl	Si raccomanda la miscela con un prodotto di copertura (TIOLENE)	14 gg	4
Asparago	Puccinia, asparagi, <i>Stemphylium vesicarium</i>	0,5 l/ha	3-4 trattamenti a cadenza di 10 -14 gg	7 gg	4
Patata. Sedano. Carota. Cavolfiore	Alternaria, Septoria, Ruggini, Oidi, Micosferella	0,4-0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 gg a seconda della pressione delle malattie	21 gg Sedano, 14 gg Patata, Cavolfiore 7 gg Carota	4
Pomodoro	Cladosporiosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti ad intervallo di 10 gg	7 gg	4
	Alternaria, Septoria, Ruggini, Oidi, Micosferella	0,4-0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 gg a seconda della pressione della malattia		
Cetriolo	Oidio, Alternariosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10 -14 gg	7 gg	4
Rosa. Garofano	Oidi, Ticchiolatura, Ruggini	100 ml/hl	2-3 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 gg	n.r.	3
Pesco	Bolla	20-30 ml/hl	2-3 trattamenti da inizio emissione foglie	7 gg	3
	Monilia		1-2 trattamenti pre-raccolta		2

FLACONE
1 litro (cartone 12 pz)



AVVERTENZE

Per Rosa e Garofano effettuare piccoli saggi preliminari di selettività prima di impiegare il prodotto su ampie superfici.

