Oxycur®

NOVITÀ

BIO PRODOTTO CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

colore Naturale

Fungicida a base di rame ossicloruro, in polvere bagnabile

Composizione
Rame metallo **50%**
(da ossicloruro tetraramico)

Formulazione
Polvere bagnabile

Confezioni
5 kg
10 kg

Registrazione
n° 9114 del 29.01.1997

ATTENZIONE

Oxycur® è un anticrittogamico in polvere bagnabile a base di ossicloruro di rame. **Oxycur®** è efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee ed arboree.

Una scelta vincente

Ampio spettro d'azione. Soluzione anti-resistenze. Impiegabile anche in Agricoltura Biologica.

Modalità d'impiego

Colture	Avversità	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	Note	N° max tratt./ anno	Periodo carenza
Vite	Peronospora, Marciume nero degli acini, Melanosi. Azione collaterale su Escoriosi.	140-200	1,4-2	Dalla post fioritura in poi, in funzione delle condizioni climatiche piogge, temperature, dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva.	4-6	21 gg.
Agrumi: Arancio, Limone, Mandarino, Clementine, Bergamotto, Cedro, Pomelo, Limetta, Chinotto, Tangerino	Antracnosi, Allupatura, Batteriosi. Azione collaterale su Fumaggine.	200-250	2,5-3	Intervenire da ingrossamento dei frutti sino al tempo di carenza, in corrispondenza di piogge infettanti.	4	14 gg.
Melo, Pero, Cotogno	Ticchiolatura	160-200	2-2,4	Da rottura gemme a prefioritura.	4	21 gg.
		100	2-2,4	Trattamenti in post fioritura.	3	
	Cancro delle pomacee, Batteriosi	250	3	Intervenire da inizio caduta delle foglie al rigonfiamento delle gemme.	2-3	
	Colpo di fuoco	200	2	Trattamenti primaverili e autunnali.	3-4	
Albicocco, Susino, Ciliegio, Mandorlo	Monilia, Corineo, Bolla, Batteriosi	250	2	Trattamenti invernali.	2	-
		200	2	I trattamenti possono essere proseguiti da rottura gemme a pre-fioritura. Cessare i trattamenti alla fioritura.	4	
Pesco, Nettarine, Percoche	Monilia, Bolla, Batteriosi	250	2-3	Trattamenti invernali.	2-3	-
		200	2	I trattamenti possono essere proseguiti da rottura gemme a pre-fioritura. Cessare i trattamenti alla fioritura.	2-3	
Olivo	Fumaggine, Piombatura, Lebbra, Rogna, Cicloconio o occhio di pavone	150-200	2-2,4	Intervenire durante il periodo primaverile e autunnale.	4-5	14 gg.
Fruttiferi a guscio: Noce, Castagno, Nocciolo	Cancri batterici, Citospora del nocciolo, Fersa del castagno	200	2-3	Trattamenti estintivi autunno-invernali e primaverili. È possibile in caso di forti attacchi batterici elevare la dose sino a 3 kg/ha (300 g/hl).	3	14 gg.

Colture	Avversità	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	Note	N° max tratt./ anno	Periodo carenza
Pomodoro da mensa*, Pomodoro da industria, Melanzana*** (in serra e campo)	Vaiolatura dei frutti, Peronospora, Marciume Zonato, Batteriosi, Marciume Nero. Azione collaterale su Muffa Grigia, Alternariosi, Antracnosi	250	2	Intervenire iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni e proseguendo per tutto il ciclo di sviluppo della coltura.	5-6	*3 gg. **10 gg.
Patata (in campo)	Peronospora, Alternaria, Batteriosi	250	2	Intervenire iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni e proseguendo per tutto il ciclo di sviluppo della coltura.	5-6	7 gg.
Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno (in campo)	Peronospora. Azione collaterale su Muffa Grigia, Marciumi Batterici	250	2	Intervenire iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni (3-4 foglie) e proseguendo sino alla naturale senescenza delle prime foglie.	4	3 gg.
Melone*, Cocomero*, Zucca*, Zucchino, Cetriolo**, Cetriolino**** (in serra e campo)	Maculatura Angolare, Peronospora	250	2	Intervenire iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni e proseguendo per tutto il ciclo di sviluppo della coltura.	4	*7 gg. **3 gg.
Cavolfiore, Broccoli (in campo)	Ruggine Bianca, Marciume Molle Batterico, Marciume Nero, Micosferella. Azione collaterale su Muffa Grigia, Alternariosi	250	2	Intervenire iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni e proseguendo per tutto il ciclo di sviluppo della coltura.	4	14 gg.
Carciofo (in campo)	Peronospora, Antracnosi	250	2	Intervenire iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni e proseguendo per tutto il ciclo di sviluppo della coltura.	3	3 gg.
Ornamentali: Cipresso	Cancro del cipresso	200-250		Intervenire quando le condizioni sono favorevoli alla malattia e ripetendoli secondo necessità.	4	-

TRATTAMENTI MEDIANTE IMPOLVERATRICI

Il prodotto si può impiegare anche in trattamenti polverulenti (ad esempio in miscela con zolfo ventilato) alla dose di 2-3 kg di formulato per ettaro in 20-30 kg di polvere.

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno

Compatibilità

Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri etc.) e con quelli contenenti Thiram.

Fitotossicità

Non trattare durante la fioritura.

Su pesco, nettarine e percoche, susino e varietà di melo e di pero cuprosensibili (vedi oltre) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, commercio.

Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico.

Agrofarmaco autorizzato dal Min. della Salute. Le informazioni sopraripportate sono indicative e parziali, prima dell'uso leggere sempre l'etichetta sul prodotto, con particolare attenzione alle frasi e simboli di pericolo.

Oxycur®: prodotto originale Isagro Spa.