

Pikar®

Fungicida ad elevata attività sistemica

Pikar® è un fungicida sistemico indicato nella difesa di numerose colture per combattere i seguenti oomiceti: *Pythium*, *Phytophthora*, *Pseudoperonospora*, *Bremia*.

Assorbito prevalentemente dalle radici e poi traslocato nell'apparato fogliare, è caratterizzato da una lunga e completa protezione ed elevata selettività sulle colture. Stimola anche la radicazione e lo sviluppo vegetativo delle piante.

Vantaggi

Elevata attività sistemica. Ottima selettività. Impiego radicale e fogliare.

Compatibilità

Non è miscibile con prodotti a reazione alcalina e oli minerali.

Fitotossicità

Non trattare in fioritura.

Modalità d'impiego

Colture	Dosi (L/ha)	Note	Periodo carenza
TRATTAMENTI FOGLIARI			
		Iniziare i trattamenti al manifestarsi delle condizioni favorevoli alle malattie. Effettuare al massimo 3 applicazioni per stagione, distanziate di almeno 10 giorni.	
Cetriolo (in serra)	1,5-1,7	Volume d'acqua: 5-15 hl/ha.	3 gg.
Zucchini (in campo e serra), Melone e Cocomero (in campo)	1,5-3	Volume d'acqua: 5-15 hl/ha (3-10 per Melone e Cocomero).	3 gg.
Lattuga (in campo)	1,5	Volume d'acqua: 4-15 hl/ha.	14 gg.
TRATTAMENTI AL TERRENO			
Peperone, Cetriolo, Zucchini (in serra), Tabacco, Floreali	5-10 ml/m ²	Impiegare in 3-6 litri di acqua per metro quadrato. Oppure distribuire 100 ml di una soluzione allo 0,15% (15 ml di prodotto in 10 litri d'acqua) per vasetto (diametro medio 11 cm) o per pianta. Effettuare 1-2 trattamenti distanziati di 7-10 giorni prima o immediatamente dopo il trapianto. Su floreali il trattamento può essere effettuato anche successivamente. Su Garofano e Gerbera distribuire 10 ml/m ² in 3-6 litri di acqua, due giorni prima dell'impianto e procedendo successivamente all'incorporamento.	-
IRRIGAZIONE A GOCCIA (in serra)			
Solanacee (Pomodoro, Peperone, Melanzana), Cucurbitacee (Cetriolo, Zucchini, Melone, Cocomero)	2	Volume d'acqua: 5-15 hl/ha. Effettuare al massimo 4 trattamenti per stagione distanziati di 7-15 giorni.	3 gg.
PREPARAZIONE DEI TERRICCIATI e dei SUBSTRATI			
Vivai e semenzai (in serra) di: Ortaggi a frutto (Pomodoro, Melanzana, Zucca), Cavoli (Cavolo broccolo, Cavolo cappuccio, Cavolo di Bruxelles, Cavolo cinese), Ortaggi a foglia (Lattuga, Erbe fresche), Ortaggi a stelo (porro), Ornamentali	300 ml/m ³	Trattare il terriccio/substrato colturale, diluendo in circa 10 litri di acqua.	-
CONCIA DEI BULBI			
Floreali e Ornamentali	300 ml/hl	Per controllare <i>Pythium ultimum</i> e <i>Phytophthora</i> , immergere i bulbi nella soluzione per 20-30 minuti. Successivamente, prima della messa a dimora, trattare il terreno con 10 ml di prodotto per metro quadrato in 3-6 litri di acqua e successivo incorporamento a circa 10-12 cm di profondità.	-
FORZATURA			
Cicoria witloof	0,3% (300 ml/hl)	Trattamento alle radici, distribuendo 3 litri di soluzione per metro quadro.	21 gg.
	12,5 ml/hl	Applicazione in fertirrigazione.	-



Composizione

Propamocarb cloridrato (722 g/l)

66,5%

Formulazione

Sospensione concentrata

Confezioni

1 L

Registrazione

n° 11642 del 14.03.2003



Pikar®:
marchio registrato Gowan Italia.
Prodotto originale Arysta.