



# Reboot®



## Composizione

**Zoxamide** 33%  
**Cimoxanil** 33%

## Formulazione

Granuli dispersibili

## Confezioni



**0,5 kg** (collo da n° 10 pz.)  
**2,5 kg** (collo da n° 4 pz.)

## Registrazione

n° 15744 del 28.01.2014



ATTENZIONE

ALTRI FUNGICIDI


## Fungicida antiperonosporico in granuli dispersibili

**Reboot®** contiene due sostanze attive efficaci nei confronti delle peronospore di varie colture. *Zoxamide* agisce per contatto e, dotata di elevata affinità con le cere cuticolari, garantisce una notevole resistenza al dilavamento, particolarmente indicata per la protezione di grappoli e frutti. *Cimoxanil*, fungicida ad azione citotropica-translaminare, agisce per contatto sulle zoospore in germinazione e, penetrando nei tessuti vegetali, è anche in grado di controllare il micelio nei primissimi stadi di sviluppo.

### Una scelta vincente

Duplici meccanismo d'azione contro la *Peronospora* (strategia antiresistenza). Efficacia sinergica. Protezione completa (germogli, foglie, grappoli), di contatto e sistemica. Import tolerance USA. Attività collaterale antibiotica. Utilizzo conforme alle richieste della filiera.

### ACIDIFICARE CONVIENE



Reboot® + Neutral®

## Modalità d'impiego

Colture	Avversità	Dosi (g/hl)	Dosi (g/ha)	Note	Periodo carenza
Vite	Peronospora ( <i>Plasmopara viticola</i> )	40-45	400-450	Intervenire in modo preventivo con un intervallo tra le applicazioni di 7-10 gg. Il prodotto esplica la massima efficacia nella protezione del grappolo. Al fine di allungare i tempi di intervento e per un'ottimale attività sulla vegetazione in attiva crescita è consigliabile miscelare con prodotti a base di Fosetil Alluminio (es. Maestro WG Advance).	28 gg.
Pomodoro	Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> )	40-45	400-450	Intervenire in modo preventivo con un intervallo tra le applicazioni di 7-10 gg.	3 gg.
Patata	Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> )	45	450	Intervenire in modo preventivo con un intervallo tra le applicazioni di 7 gg.	7 gg.

## Compatibilità

Effettuare preventivamente saggi preliminari di compatibilità per eventuali miscele con concimi fogliari contenenti azoto e fitoregolatori.

## Avvertenze

Non applicare questo o altri prodotti contenenti Zoxamide più di 5 volte nell'arco della stagione e comunque non più di 3 volte consecutive.

Agrofarmaco autorizzato dal Min. della Salute. Le informazioni soprariportate sono indicative e parziali, prima dell'uso leggere sempre l'etichetta sul prodotto, con particolare attenzione alle frasi e simboli di pericolo.