



# Sarmox<sup>®</sup> 45 DG

## Composizione

Cimoxanil **45%**

## Formulazione

Microgranuli idrodispersibili

## Confezioni



**0,5 kg** (collo da n° 10 pz.)

## Registrazione

n° 14193 del 11.04.2008



ATTENZIONE

## Fungicida citotropico translaminare

**Sarmox<sup>®</sup> 45 DG** è un fungicida ad azione citotropica translaminare, efficace contro la peronospora; agisce per contatto sulle zoospore germinanti e, penetrando nei tessuti vegetali, è anche in grado di colpire il micelio nei primissimi stadi di sviluppo.

### Una scelta vincente

Perfetta selettività. Attività preventiva e curativa. Sicuro per l'operatore.

## Modalità d'impiego

Colture	Avversità	Dosi (g/hl)	Dosi (g/ha)	N° max trattamenti	Periodo carenza
Vite	Peronospora	30-35	300-330	4	28 gg.
Patata	Peronospora	30-35	300-330	5	7 gg.
Pomodoro, Melanzana (in pieno campo e in serra)	Peronospora	30-35	300-330	5	3 gg.
Melone, Anguria, Zucca (in pieno campo)	Peronospora	30-40	300-400	4	11 gg.
Cetriolo, Zucchini (in pieno campo)	Peronospora	30-40	300-400	4	3 gg.
Cetriolo, Zucchini (in serra)	Peronospora	25-30	270	4	3 gg.
Lattughe (in pieno campo)	Peronospora	30-40	300-400	4	10 gg.
Spinaci (in pieno campo)	Peronospora	30-40	300-400	4	10 gg.
Cipolla (in pieno campo)	Peronospora	40-50	400-500	4	10 gg.
Carciofo (in pieno campo)	Peronospora	30-40	300-400	3	14 gg.

## Compatibilità

Non è miscibile con prodotti a reazione alcalina e oli.

## Avvertenze

Iniziare i trattamenti preventivi non appena inizia il pericolo di infezioni peronosporiche.

Viste le peculiari modalità di azione del prodotto (citotropicità, curatività) è sempre consigliabile usarlo in miscela con prodotto di contatto e/o endotepici a diverso meccanismo e modalità d'azione.

Per cipolla trattare fino alla fase di metà delle piante con foglie coricate e per carciofo trattare fino alla fase di raggiungimento del 50% della massa fogliare.

Per garantire una migliore efficacia del prodotto, si consiglia di acidificare la soluzione a valori di pH compresi tra 5 e 6.

Qualora si utilizzino apparecchiature a basso volume impiegare la dose di prodotto per ettaro che si impiegherebbe con attrezzatura a volume normale.

*Agrofarmaco autorizzato dal Min. della Salute. Le informazioni soprariportate sono indicative e parziali, prima dell'uso leggere sempre l'etichetta sul prodotto, con particolare attenzione alle frasi e simboli di pericolo.*