

Fungicida sistemico ad azione preventiva, curativa e bloccante

Scudex[®] è un fungicida sistemico che può essere impiegato come preventivo, curativo e come bloccante nei confronti di numerose crittogame.

Viene assorbito rapidamente da parte degli organi vegetali nel giro di poche ore.

Una scelta vincente

Elevata attività sistemica. Efficacia prolungata. Largo spettro d'azione.



Composizione

Penconazolo (100 g/l) **10,2%**

Formulazione

Liquido emulsionabile

Confezioni

1 L (collo da n° 12 pz.)



Registrazione

n° 10425 del 29.03.2000



ATTENZIONE

Modalità d'impiego

Colture	Avversità	Dosi (ml/hl)	Note	Periodo carenza
Vite	Oidio	25-30	Ogni 14-16 gg. in pre e post-fioritura.	14 gg.
		15-20	Ogni 7-10 gg. in pre e post-fioritura.	
	50	Con attacchi in atto effettuare 2 trattamenti, ogni 5-7 gg. Poi continuare con trattamenti di tipo preventivo. Attività collaterale contro <i>Guignardia spp.</i> e, in minor misura, <i>Pseudopeziza spp.</i>		
Melo	Ticchiolatura	30-40	Preventivi: ogni 7-8 gg. fino a frutto noce, poi ogni 10-14 gg.	14 gg.
		35-40	Curativi: entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.	
		35-40	Bloccanti*: 2 applicazioni ogni 7 giorni.	
	Oidio	30-40	Preventivi: in primavera ogni 10 gg., in estate ogni 10-14 gg.	
		30-35	Bloccanti: 3 applicazioni, ogni 7 giorni.	
Malattie da conservazione	35-40	Pre-raccolta: max 3 applicazioni, a cadenza settimanale.		
Pero	Ticchiolatura	25-35	Preventivi: ogni 10-12 gg.	14 gg.
		30-40	Curativi: entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.	
		30-40	Bloccanti*: 2 applicazioni ogni 5-7 giorni.	
Pesco	Oidio	40-50	Preventivi: da caduta petali ogni 10-14 gg. (in zone di minor rischio ogni 14-21 gg.).	14 gg.
	Malattie da conservazione	50	In pre-raccolta: 2-3 applicazioni ogni settimana.	
Melone, Zucchini, Zucca, Cetriolo, Peperone, Pomodoro (in pieno campo)	Oidio	25-50	In pieno campo, o dopo la rimozione del telo di protezione, intervenire preventivamente o alla comparsa dei primi sintomi. 2-4 applicazioni, ogni 14-16 gg., secondo la coltura ed il rischio di infezione.	14 gg.
Tabacco	Oidio	35-50	Da 2 a 4 trattamenti in modo preventivo, iniziando dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.	14 gg.
Ornamentali, Fiori	Oidio, Ruggini	25-50	Ogni 10-14 gg., a seconda della coltura e dell'incidenza della malattia.	14 gg.

* Negli interventi bloccanti (in presenza di sintomi) è consigliabile l'aggiunta di un prodotto di copertura.

Fitotossicità

Non trattare in fioritura. Effettuare saggi preliminari di selettività specie su floreali ed ornamentali.

Avvertenze

Trattare nelle ore più fresche della giornata.

Agrofarmaco autorizzato dal Min. della Salute. Le informazioni soprariportate sono indicative e parziali, prima dell'uso leggere sempre l'etichetta sul prodotto, con particolare attenzione alle frasi e simboli di pericolo.