



Sponsor®

Composizione

Difenconazolo (250 g/l) **23,6%**

Formulazione

Emulsione concentrata

Confezioni

0,5 L (collo da n° 20 pz.)



Registrazione

n° 13926 del 13.09.2007



PERICOLO

Fungicida triazolico sistemico per la lotta contro numerose malattie

Sponsor® è un fungicida sistemico dotato di lunga persistenza e spiccata attività preventiva, curativa ed eradicante. Similmente agli altri triazoli, agisce sulla sintesi dell'ergosterolo, inibendo la crescita subcuticolare del micelio e di conseguenza la sporulazione. Molto interessante è risultata la spiccata attività di contenimento della bolla del pesco, nell'annata successiva a quella dove sono stati effettuati trattamenti con Sponsor® contro la Monilia dei frutti in pre-raccolta.

Una scelta vincente

Attività elevata e costante. Azione preventiva, curativa e bloccante. Breve periodo di sicurezza. Registrato anche su Finocchio.

Modalità d'impiego

Colture	Avversità	Dosi (ml/hl)	Dosi (L/ha)	Note	N° max tratt./anno	Periodo carenza
Pesco	Bolla (<i>Taphrina deformans</i>), Monilia (<i>Monilinia fructicola</i>)	30	0,3-0,45	Da apertura gemme.	2 (ogni 7 gg.)	7 gg.
Melo, Pero	Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i>), Oidio (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	15	0,225 (max 0,3)	Da inizio fioritura. Si raccomanda la miscela con un prodotto di copertura	4 (ogni 10 gg.)	14 gg.
Vite	Black-rot (<i>Guignardia bidwellii</i>), Oidio (<i>Erysiphe necator</i>)	20	0,2	Da inizio sviluppo vegetativo.	4 (ogni 10 gg.)	21 gg.
Olivo	Occhio di Pavone (<i>Cycloconium spp.</i>)	50	0,5	Da inizio sviluppo vegetativo.	2 (ogni 14 gg.)	30 gg.
Asparago (pieno campo)	<i>Puccinia asparagi</i> , <i>Stemphylium spp.</i>	50	0,5	Da inizio sviluppo fogliare.	3 (ogni 14 gg.)	
Carota, Cavolfiore e Sedano (pieno campo)	<i>Alternaria spp.</i> , <i>Mycosphaerella spp.</i> , <i>Oidium spp.</i> , <i>Septoria spp.</i> , <i>Uromyces spp.</i>	40-50	0,4-0,5	Da inizio sviluppo fogliare.	3 (ogni 14 gg.)	14 gg.
Sedano (serra)	<i>Alternaria spp.</i> , <i>Mycosphaerella spp.</i> , <i>Oidium spp.</i> , <i>Septoria spp.</i> , <i>Uromyces spp.</i>	40-50	0,4-0,5	Da inizio sviluppo fogliare.	2 (ogni 14 gg.)	14 gg.
Pomodoro, Melanzana (pieno campo* e serra**)	<i>Cladosporium spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i> , <i>Leveillula taurica</i> , <i>Mycosphaerella spp.</i> , <i>Septoria spp.</i> , <i>Uromyces spp.</i>	40-50	0,4-0,5	Da inizio sviluppo fogliare.	3 (ogni 7 gg.)	* = 7 gg. ** = 3 gg.
Cetriolo (pieno campo e serra)	Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), Alternariosi (<i>Alternaria spp.</i>)	50	0,5	Da inizio fioritura.	3 (ogni 8 gg.)	3 gg.
Finocchio (pieno campo)	<i>Ramularia (Ramularia spp.)</i>	50	0,5	Da inizio sviluppo fogliare.	3 (ogni 8 gg.)	3 gg.
Broccoli (pieno campo)	<i>Alternaria spp.</i> , <i>Mycosphaerella spp.</i> , <i>Oidium spp.</i> , <i>Septoria spp.</i> , <i>Uromyces spp.</i>	50	0,5	Da inizio sviluppo germogli.	3 (ogni 7 gg.)	14 gg.
Barbabietola da zucchero	<i>Cercosporiosi (Cercospora beticola)</i>	20-30	0,2-0,3	Da copertura fogliare 10% della superficie del terreno.	3 (ogni 21 gg.)	21 gg.
Patata	<i>Alternaria spp.</i> , <i>Mycosphaerella spp.</i> , <i>Oidium spp.</i> , <i>Septoria spp.</i> , <i>Uromyces spp.</i>	40-50	0,4-0,5	Da inizio sviluppo tuberi.	3 (ogni 7 gg.)	3 gg.
Rosa, Garofano (pieno campo e serra)	Oidio (<i>Sphaerotheca pannosa</i>), Ticchiolatura (<i>Marssonina spp.</i>), Ruggini (<i>Phragmidium tuberculatum</i> , <i>Uromyces caryophyllinus</i>)	50	0,5	Effettuare piccoli saggi preliminari di selettività prima di impiegare il prodotto su ampie superfici	3 (ogni 14 gg.)	-

Avvertenze

Trattare nelle ore più fresche della giornata.

Su Rosa e Garofano effettuare piccoli saggi preliminari di selettività prima di impiegare il prodotto su ampie superfici.

Agrofarmaco autorizzato dal Min. della Salute. Le informazioni soprariportate sono indicative e parziali, prima dell'uso leggere sempre l'etichetta sul prodotto, con particolare attenzione alle frasi e simboli di pericolo.

Sponsor®: marchio registrato Gowan Italia.