



TIOWETTING-DF

FUNGICIDA A BASE DI ZOLFO MICRONIZZATO
IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI MECCANISMO D'AZIONE M 02 (FRAC)

- **Per la difesa della vite e di altre colture dall'oidio o "mal bianco"**, lo zolfo agisce nei confronti del patogeno causando la rottura della parete cellulare ed alterando i processi enzimatici della cellula.
- Attività esaltata da **temperature** relativamente **elevate** e da **umidità** dell'aria su valori limitati.
- La particolare formulazione caratterizzata dall'assenza di polvere consente una rapida disperdibilità in acqua ed una facile preparazione della miscela.
- Assicura un'elevata protezione della coltura ed una più prolungata persistenza d'azione.



Applicazione sulla pianta



COMPOSIZIONE

ZOLFO puro g 80



REGISTRAZIONE

n. 9724 del 03/09/1998



CLASSIFICAZIONE

CLP Non classificato



FORMULAZIONE

Microgranuli idrodispersibili



CONFEZIONI

kg 10 - kg 25



CARENZA

Sulle colture eduli, sospendere i trattamenti **5 giorni** prima del raccolto.



MISCIBILITÀ E AVVERTENZE

Il prodotto non è compatibile con antiparassitari alcalini (Polisolfuri, Poltiglia bordolese, ecc.), Olii minerali, Captano ed inoltre deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli Olii minerali e del Captano. Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza, attenersi alle indicazioni riportate in etichetta.



COLTURE



PATOGENI



DOSE



NOTE

VITE	Oidio (<i>Uncinula necator</i>)	0,2-0,4 kg/hl 0,4-0,5 kg/hl	Trattamenti preventivi Trattamenti curativi
POMACEE	Oidio (<i>Podosphaera spp.</i>)	0,2-0,5 kg/hl 0,2-0,3 kg/hl	Dalla ripresa vegetativa fino alla fase di caduta petali Dalla caduta petali fino in prossimità della raccolta
PESCO, NETTARINA, SUSINO, CILIEGIO, ALBICOCCO	Oidio (<i>Podosphaera spp.</i> , <i>Spaerotheca pannosa</i>)	0,2-0,5 kg/hl	Dalla fase di rigonfiamento gemme alla fase di frutti completamente sviluppati
AGRUMI	Oidio	0,2-0,5 kg/hl	Dalle prime foglie completamente aperte fino in prossimità della raccolta
FRAGOLA	Oidio (<i>Podosphaera aphanis</i>)	0,2-0,5 kg/hl	Dalla prima fioritura fino in prossimità della raccolta.
PATATA	Oidio	0,2-0,5 kg/hl	Da 1-9 foglie e oltre fino in prossimità della raccolta
CAVOLI, BIETOLE DA FOGLIA E DA COSTA	Oidio	0,2-0,5 kg/hl	Da crescita rosetta fino in prossimità della raccolta
POMODORO, MELANZANA, CUCURBITACEE	Oidio	0,2-0,5 kg/hl	Da 1-9 foglie e oltre fino in prossimità della raccolta
CEREALI	Oidio (<i>Erysiphe graminis</i>)	8kg/Ha	Dalla fase di più di 3 culmi di accestimento visibili fino a fine fioritura.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Oidio (<i>Erysiphe betae</i>)	8kg/Ha	Dalle 4 foglie fino in prossimità della raccolta
GIRASOLE,	Oidio	4-6 kg/Ha	Da fine allungamento del culmo ad apertura calaride
TABACCO	Oidio	4-6 kg/Ha	Dal trapianto fino a poco prima della raccolta
SOIA	Oidio	4-6 kg/Ha	Da foglie trifogliate al completo ingrossamento dei semi
VIVAI DI PIOPPO	Oidio	0,2-0,4 kg/hl	Dopo la ripresa vegetativa in primavera/estate
OLIVO	Fumaggine (<i>Capnodium elaeophilum</i>)	0,2-0,4 kg/hl	Da frutti circa il 10% delle dimensioni finali fino in prossimità della raccolta
NOCCIOLO	Oidio	0,3-0,5 kg/hl	Da inizio fioritura a caduta foglie
ORNAMENTALI ARBOREE FLOREALI ED ORNAMENTALI	Oidio	0,15-0,4 kg/hl	Dopo la ripresa vegetativa in primavera/estate Durante tutto il ciclo vegetativo

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.