

**VITENE® ULTRA SC**

Fungicida in sospensione concentrata

VITENE ULTRA SC – Composizione:  
 Cimoxanil ..... g 20.83 (= 225 g/l)  
 Coformulanti e inerti q.b. a. .... g 100  
 Contiene 1,2-Benzisothiazolinone

**INDICAZIONI DI PERICOLO**

Può provocare una reazione allergica della pelle (H317). Provoca grave irritazione oculare (H319). Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto (H361fd). Può provocare danni agli organi (sangue, timo) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (H373). Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H411). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

**ATTENZIONE****CONSIGLI DI PRUDENZA**

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto (P101). Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso (P201). Se l'irritazione degli occhi persiste: togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare (P337; P338). Se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico (P337; P313). In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico (P333; P313). Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol (P260). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso (P270). Non disperdere nell'ambiente (P273). Indossare guanti. (P280). In caso di esposizione o di possibile esposizione: consultare un medico (P308+P313). **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare (P305+P351+P338). Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente (P362+P364). In caso di malessere, consultare un medico (P314). Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente (P363). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il contenuto/recipiente in conformità con le disposizioni nazionali (P501).

**SIPCAM ITALIA S.p.A.**

Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Tel. +39 02/353781

Autorizzazione Ministero della Salute n. 13064 del 25.01.2011

**Officine di produzione:**

SIPCAM OXON S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)

**Officina di confezionamento:**

INDUPHARMA SRL - Via Sorgaglia 40, 35020 Arre (PD)

Kollant S.r.l. - Via C. Colombo 7A, 30030 Vigonovo (VE)

GLMA SRL - Via N. Bixio 6, 44042 Cento (FE)

**Distribuito da:**

ITAL-AGRO S.r.l. - Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: ml 100-250-500 Lt. 1-1,5-3-5-20

Partita n° .....

® Marchio registrato

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Usare guanti durante la miscelazione, il carico e l'applicazione del prodotto. Usare casco con visiera, guanti, tuta da lavoro stretta e stivali impermeabili durante l'applicazione.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Cimoxanil (derivato dell'urea). **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono

citati subittero ed ematuria. **Terapia:** sintomatica. **Controindicazioni:** nessuna.

**AVVERTENZA:** consultare un Centro Antiveleni.**CARATTERISTICHE**

Il prodotto è un fungicida ad azione citotropica translaminare, efficace contro le diverse specie di peronospora; agisce per contatto sulle zoospore germinanti e penetrando nei tessuti vegetali, è anche in grado di colpire il micelio nei primissimi stadi di sviluppo.

**AVVERTENZE:**

Viste le peculiari modalità d'azione del prodotto (citotropicità, curatività) è sempre consigliabile usarlo in miscela con prodotti di contatto registrati o in miscele complesse comprendenti Fosetil Al. Iniziare i trattamenti preventivi o all'inizio del periodo infettivo e proseguire con cadenze dettate dalle molecole partners e dalla pressione della malattia. Il prodotto è selettivo anche durante la fioritura.

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO**

Per cipolla trattare fino alla fase di metà delle piante con foglie coricate e per carciofo trattare fino alla fase di raggiungimento del 50% della massa fogliare. Per la lattuga trattare fino al raggiungimento dell'80% della dimensione finale della testa.

| Coltura                                  | Dose di impiego |         | N. massimo di trattamenti |   |
|--|-----------------|---------|---------------------------|---|
|  | ml/hl           | ml/ha   |                           |   |
| Vite da vino/<br>Vite da tavola          | Campo           | 55-65   | 550-650                   | 4 |
| Pomodoro,<br>Melanzana                   | Campo/Serra     | 55-65   | 550-650                   | 5 |
| Patata                                   | Campo           | 55-65   | 550-650                   | 5 |
| Carciofo                                 | Campo           | 60-100  | 600                       | 3 |
| Melone, Anguria,<br>Zucca                | Campo           | 60-100  | 600                       | 4 |
| Zucchini, Cetriolo                       | Campo/Serra     | 60-100  | 600                       | 4 |
| Lattuga e insalate                       | Campo           | 60-100  | 600-800                   | 4 |
| Spinaci, bietole da<br>costa e da foglia | Campo           | 60-100  | 600-800                   | 4 |
| Basilico <sup>1</sup>                    | Campo           | 60-100  | 600-800                   | 4 |
| Cipolla                                  | Campo           | 100-150 | 600                       | 4 |
| Tabacco                                  | Campo           | 65-90   | 500-540                   | 2 |

**PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA**

Per garantire una migliore efficacia del prodotto si consiglia di acidificare la soluzione tra valori di pH compresi tra 5 - 6.

**FITOTOSSICITÀ**

Il prodotto può essere fitotossico su colture non riportate in etichetta. In caso di miscele con altri agrofarmaci e/o fertilizzanti effettuare saggi preliminari al fine di valutarne la selettività.

Visto l'elevato numero di cultivars e il veloce rinnovo varietale, effettuare prove preliminari di selettività prima di intervenire su tutta la superficie coltivata.

Per lo spinacio non concentrare la soluzione irrorata in periodi freddi e/o con forti sbalzi termici fino alle 4-6 foglie vere della coltura.

**GESTIONE DELLE RESISTENZE**

Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare VITENE ULTRA SC ad altri fungicidi.

**COMPATIBILITÀ**

Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usarlo in associazione a prodotti con reazione alcalina ed oli minerali. In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela, preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.

**Sospendere i trattamenti: 28 giorni prima della raccolta per vite; 14 giorni prima della raccolta per carciofo; 11 giorni prima della raccolta per melone, anguria, zucca; 10 giorni prima della raccolta per lattuga e insalate in campo, basilico<sup>1</sup>, cipolla e per spinaci,**

## ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

bietole da costa e da foglia; 7 giorni prima della raccolta per tabacco e patata; 3 giorni prima della raccolta per pomodoro, melanzana, cetriolo e zucchini.

### ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

**VITENE® ULTRA SC****Fungicida in sospensione concentrata**

VITENE ULTRA SC – Composizione:

Cimoxanil . . . . . g 20.83 (=225g/lt)

Coformulanti e inerti q.b. a . . . . g 100

Contiene 1,2-Benzisothiazolinone

**ATTENZIONE****INDICAZIONI DI PERICOLO**

Può provocare una reazione allergica della pelle (H317). Provoca grave irritazione oculare (H319). Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto (H361fd). Può provocare danni agli organi (sangue, timo) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (H373). Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H411). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto (P101). Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso (P201). Se l'irritazione degli occhi persiste: togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare (P337; P338). Se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico (P337; P313). In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico (P333; P313). Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol (P260). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso (P270). Non disperdere nell'ambiente (P273). Indossare guanti. (P280). In caso di esposizione o di possibile esposizione: consultare un medico (P308+P313). **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare (P305+P351+P338). Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente (P362+P364). In caso di malessere, consultare un medico (P314). Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente (P363). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il contenuto/recipiente in conformità con le disposizioni nazionali (P501).

**SIPCAM ITALIA S.p.A.**

Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Tel. +39 02/353781

Autorizzazione Ministero della Salute n. 13064 del 25.01.2011

**Officine di produzione:**

SIPCAM OXON S.p.A.-Salerano sul Lambro (LO)

**Officina di confezionamento:**

INDUPHARMA SRL - Via Sorgaglia 40, 35020 Arre (PD)

Kollant S.r.l. - Via C. Colombo 7A, 30030 Vigonovo (VE)

Taglie: ml 100

Partita n.:.....

® Marchio registrato

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Usare guanti durante la miscelazione, il carico e l'applicazione del prodotto. Usare casco con visiera, guanti, tuta da lavoro stretta e stivali impermeabili durante l'applicazione.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Cimoxanil (derivato dell'urea). **Sintomi:** durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. **Terapia:** sintomatica. **Controindicazioni:** nessuna.

**AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleeni.****PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.****SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.****IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.****IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE****ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**