



Composizione

Tebuconazolo 25%

Formulazione

Granuli idrodispersibili

Confezioni



0,5 kg (collo da n° 20 pz.)

Registrazione

n° 12994 del 28.04.2011



ATTENZIONE

Fungicida sistemico a largo spettro di azione in granuli idrodispersibili

Viver® Elite WG è un fungicida triazolico sistemico ad ampio spettro di azione, efficace contro numerosi patogeni ad azione preventiva, curativa ed eradicante.

È selettivo nei confronti dell'acarofauna utile. La formulazione in microgranuli ne rende pratico e sicuro l'impiego.

Una scelta vincente

Efficacia elevata e costante. Attività preventiva, curativa e bloccante. Particolarmente attivo sulle monilie delle drupacee e sulla fusariosi della spiga dei cereali.

Modalità d'impiego

Culture	Avversità	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	Note	N° max tratt./anno	Periodo carenza
Melo, Pero	Ticchiolatura	40-50	Max 0,75	In miscela con fungicidi citotropici o di copertura. Intervenire preventivamente ogni 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce; successivamente allungare l'intervallo fra i trattamenti a 10-15 giorni. Trattamenti curativi entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione.	3	14 gg.
	Oidio	40-50	Max 0,75			
	Maculatura bruna del pero	50	Max 0,75			
Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino	Monilia e Botrite	50-75	Max 1,125	1-2 trattamenti a cavallo della fioritura o in pre-raccolta a distanza di 7 giorni.	2	7 gg.
	Oidio	50-75	Max 1,125			
	Ruggine del Susino	50	Max 1,125	1-2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi.		
Noce ed altri frutti a guscio	Antracnosi, Necrosi apicale bruna	70	Max 1,05	Trattamenti ogni 14 giorni a partire dalla fioritura.	2	-
Vite	Oidio	40	Max 0,4	Trattamenti ogni 10-14 giorni, in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione.	3	14 gg.
Cetriolo, Zucchini, Pomodoro, Peperone	Oidio	50	Max 0,5	Trattamenti ogni 7-10 giorni. Su melone, cetriolo, zucchini, pomodoro applicazioni consentite sia in pieno campo che in serra. Su cocomero applicazioni consentite solo in pieno campo.	4	3 gg.
	Melone, Zucca, Cocomero, Carciofo					7 gg.
Aglio	Ruggine	-	1		2	21 gg.
Fumento, Orzo	"Mal del piede"	-	1	In fase di accestimento-levata.	1	30 gg.
	Oidio, Ruggini, Rincosporiosi, Elmintosporiosi, Septoria	-	1	Dalla fase di inizio levata alla spigatura.		
	Fusariosi della spiga	-	1	In fase di piena fioritura.		
Tappeti erbosi	<i>Microdochium nivale</i> , <i>Sclerotinia homeocarpa</i> , <i>Rhizoctonia solani</i>	-	1,5-2	Intervenire alla comparsa dei primi sintomi e, successivamente, dopo 10-20 giorni in funzione dell'evoluzione epidemica della malattia.	2	-

Compatibilità

Il prodotto può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.

Avvertenze

In caso di impiego su tappeti erbosi è obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.

Agrofarmaco autorizzato dal Min. della Salute. Le informazioni sopraindicate sono indicative e parziali, prima dell'uso leggere sempre l'etichetta sul prodotto, con particolare attenzione alle frasi e simboli di pericolo.

Viver®: marchio registrato Gowan Italia.