



Botto[®] 50 EC

Composizione

Cypermotrina (50 g/l) 5,52%

Formulazione

Emulsione concentrata

Confezioni



1 L (collo da n° 12 pz.)

Registrazione

n° 15621 del 26.11.2012



ATTENZIONE

Insetticida piretroide ad ampio spettro di azione

Botto[®] 50 EC è un insetticida piretroide ad ampio spettro d'azione che agisce per contatto e ingestione.

Una scelta vincente

Impiegabile su numerose colture. Azione pronta e duratura. Breve intervallo di sicurezza su colture orticole.

Modalità d'impiego

Colture	Avversità	Dosi (ml/hl)	Dosi (L/ha)	Note	Periodo carenza
Vite da vino e da tavola	Tignola, Tignoletta, Cicaline, Sigaraio, <i>Sparganothis pilleriana</i>	40-300	0,6	Effettuare 1 trattamento per stagione.	21 gg.
Olivo (piante non in produzione)	Mosca, Tignola verde e Tignola	80-100	0,8-1	Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.	-
Patata	Dorifora, Tignola	80-250	0,8-1	Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione, distanziati di almeno 10 giorni.	3 gg.
Carciofo	Afidi, Nottue	100-130	1	Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione, distanziati di almeno 10 giorni.	3 gg.
ORTICOLE IN PIENO CAMPO: Ortaggi a radice (Carota, Prezzemolo a grossa radice, Pastinaca, Cren, Sedano-Rapa, Ravanella, Bietola rossa*, Rutabaga*, Rapa*), Ortaggi a bulbo (Cipolla, Aglio, Scalogno), Ortaggi a frutto (Pomodoro, Melanzana, Okra, Melone, Zucca, Cocomero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile), Cavoli (Cavolfiori, Broccoli, Cavoli a testa), Legumi (Pisello, Pisello mangiatutto, Fagiolo, Fagiolino)	Nottuidi terricoli e fogliari, Coleotteri, Afidi, Tripidi, Mosche bianche, Cleono, Lisso, Dorifora, Diabrotica, Sitona, Tignola del porro, Cicaline	100-500	1	Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di almeno 10 giorni.	3 gg. * = 14 gg.
Asparago		60-200	1	Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione, distanziati di almeno 10 giorni.	Trattare dopo la raccolta dei turioni
Colza, Senape, Lino	Altica, <i>Ceuthorinchus</i> , Meligete, effetto collaterale su <i>Dasineura brassicae</i>	125-330	0,5	Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione, distanziati di almeno 14 giorni.	21 gg.
Cotone	Afidi, Lepidotteri, Tripidi	100-320	0,5	Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione, distanziati di almeno 10 giorni.	21 gg.

Colture	Avversità	Dosi (ml/hl)	Dosi (L/ha)	Note	Periodo carenza
Barbabietola da zucchero e da foraggio	Nottuidi terricoli e fogliari, Coleotteri, Afdi, Cassida, Cleono, Lisso	100-500	1	Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione, distanziati di almeno 10 giorni.	14 gg.
Fruento, Segale, Triticale, Orzo, Avena, Spelta (farro maggiore)	Afdi, Lema, Lepidotteri	80-300	0,5	Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione, distanziati di almeno 14 giorni.	28 gg.
Mais	Piralide, Sesamia, Nottua gialla e Nottua delle messi, Diabrotica	150-1000	1,5	Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione, distanziati di almeno 10 giorni.	Trattare entro fine fioritura
Erba medica	Nottuidi terricoli e fogliari, Crisomelide nero, Punteruolo, Afdi, Tripidi, Mosca Bianca, Misurino	60-200	1	Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione, distanziati di almeno 10 giorni.	7 gg.
Tabacco	Lepidotteri, Afdi, Mosca bianca, Cassida vittata	60-200	1	Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione, distanziati di almeno 10 giorni.	14 gg.
Floreali, Ornamentali, Pioppo in vivaio e giovani impianti forestali in vivaio	Afdi, Nottue, Coleotteri, Tripidi, Mosche, Cocciniglie, Mosche bianche, Saperda e Punteruolo del pioppo, Limantria	100-200	0,5-1	Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione, distanziati di almeno 10 giorni.	-

Compatibilità

Non miscelare con prodotti a reazione alcalina.

Avvertenze

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa degli insetti bersaglio. Non usare il prodotto in fioritura.

Agrofarmaco autorizzato dal Min. della Salute. Le informazioni soprariportate sono indicative e parziali, prima dell'uso leggere sempre l'etichetta sul prodotto, con particolare attenzione alle frasi e simboli di pericolo.