

MILBEKN[®]CK

Efficace sugli acari
Rispettoso degli insetti utili



Efficace sugli acari Rispettoso degli insetti utili



ORIGINE NATURALE

La Milbemectina, principio attivo di MILBEKNOCK®, è una sostanza naturale prodotta dalla fermentazione del microrganismo del suolo *Streptomyces hygroscopicus*.

CARATTERISTICHE

- Attivo per contatto e ingestione
- Azione translaminare
- Efficacia indipendente dalla temperatura
- Elevata persistenza
- Sicuro verso gli insetti utili

ELEVATO SPETTRO D'AZIONE

Milbeknock è attivo su un grande numero di acari dannosi, risultando efficace verso i più importanti target che infestano le colture (*Panonychus ulmi*, *Tetranychus urticae*, *Phyllocnistis citrella*).

MECCANISMO D'AZIONE : IRAC 6

La Milbemectina ha un meccanismo d'azione unico che lo differenzia dagli altri acaricidi presenti sul mercato. Inibitore del GABA (Acido Gamma Ammino Butirrico), mediatore della trasmissione nervosa, provoca inizialmente la paralisi dell'acaro, quindi la cessazione dell'alimentazione e la successiva morte.

IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	NOTE	DOSE	TEMPO DI CARENZA
MELO	Ragnetto rosso (<i>Panonychus ulmi</i>)	Interventi a partire dalla fine della fioritura	100 - 125 ml/hl (max 1,875 l/ha)	14
FRAGOLA	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	Interventi all'inizio dell'infestazione	125 - 150 ml/hl (max 0,9 l/ha)	3
ARANCIO, MANDARINO	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>), Ragnetto rosso degli agrumi (<i>Panonychus citri</i>), Minatrice serpentina degli agrumi (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	Interventi all'inizio dell'infestazione	150 ml/hl (max 3 l/ha)	14
FLOREALI E ORNAMENTALI (in serra)	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	Intervenire alla comparsa delle prime forme mobili	50 ml/hl (max 0,35 l/ha)	-



CONSIGLI PER L'USO

Applicare Milbeknock all'inizio dell'infestazione (max 3 forme mobili per foglia), ripetendo le applicazioni a seconda del grado di reinfestazione in campo e rispettando un intervallo minimo di 7 giorni.

Per evitare l'insorgenza di fenomeni di resistenza è opportuno utilizzare MILBEKNOCK in alternanza con prodotti appartenenti ad altri gruppi IRAC.

SCHEDA TECNICA

Composizione Milbemectina 9,3 g/L

Formulazione Concentrato emulsionabile (EC)

Meccanismo d'azione IRAC 6

Classificazione CLP



Reg. Ministero della Salute 12860 del 23/05/2007

Confezione 1 L

© Marchio registrato e sostanza attiva originale Mitsui Chemicals Agro, Inc.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.



Belchim Crop Protection Italia S.p.A.

Centro Direzionale Milanofiori | Strada 6 Palazzo N 3 | 20089 Rozzano (MI)
Tel. 02 33599422 • 02 33576501 • Fax 02 87152284 | www.belchim.it

Per maggiori informazioni
inquadra il QrCode e
scarica la nostra APP

