



Sanmite® 10 SC

Composizione

Pyridaben (100 g/l) **9,69%**

Formulazione

Sospensione concentrata

Confezioni



1 L (collo da n° 12 pz.)

Registrazione

n° 15438 del 27.11.2017



Insetticida - Acaricida efficace nei confronti di larve e adulti

Sanmite® 10 SC è un acaricida di nuova classe chimica dotato di attività di contatto e residuale nei confronti di insetti ed acari, efficace sulle forme mobili sia agli stadi larvali sia sugli adulti, mostrando elevata attività abbattente nei confronti di larve e adulti dei principali acari fitofagi e mosca bianca, con particolare riferimento a *Panonychus ulmi*, *Panonychus citri*, *Tetranychus spp.*, *Trialeurodes vaporariorum* e *Bemisia tabaci*.

Una scelta vincente

Lunga persistenza d'azione. Efficace contro tutte le forme mobili degli acari fitofagi. Attivo anche nei confronti della Mosca bianca.

Modalità d'impiego

Colture	Avversità	Dosi (ml/ha)	Note	N° max tratt./anno	Periodo carenza
Agrumi (in pieno campo)	Acari, Mosca bianca	150-200	Impiegare un volume d'acqua di 1500-2000 L/ha.	1	14 gg.
Pomodoro, Melanzana, Peperone (in serra)	<i>Tetranychus spp.</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>	140-200	Impiegare un volume d'acqua di 1000-1400 L/ha.	1	3 gg.
Cetriolo, Cetriolino, Zucchini (in serra)	<i>Panonychus ulmi</i>	140-200	Impiegare un volume d'acqua di 1000-1400 L/ha.	1	3 gg.
Ornamentali (floricoltura e vivai di piante legnose) (in serra)		140	Impiegare un volume d'acqua di 500-1400 L/ha.	1	3 gg.

Compatibilità

Il prodotto si impiega da solo.

Avvertenze

Intervenire tra le fasi di pre-fioritura e fruttificazione e comunque alla comparsa degli stadi suscettibili (larve e adulti).

Nel caso di applicazioni a volume ridotto, mantenere per unità di superficie le stesse dosi che verrebbero impiegate con il volume normale.

È importante, durante l'applicazione, ottenere una bagnatura abbondante e uniforme della vegetazione in modo che il prodotto giunga a contatto dei fitofagi.

Il prodotto può essere pericoloso per gli insetti impollinatori in serra.

Si consiglia di verificare la compatibilità degli insetti impollinatori utilizzati con il trattamento con Sanmite® 10 SC rispettando comunque un tempo di attesa di 24 ore dal trattamento prima di introdurre gli insetti nella serra.

Non trattare mai in fioritura.

Come buona pratica si consiglia, dopo il trattamento, di risciacquare l'attrezzatura con acqua.

Agrofarmaco autorizzato dal Min. della Salute. Le informazioni soprariportate sono indicative e parziali, prima dell'uso leggere sempre l'etichetta sul prodotto, con particolare attenzione alle frasi e simboli di pericolo.