



DYNASTY

FUNGICIDA AD AMPIO SPETTRO PER BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E COLTURE ORTICOLE
SOSPENSIONE CONCENTRATA
MECCANISMO D'AZIONE: GRUPPO C3 (CODICE FRAC 11) E GRUPPO G1 (CODICE FRAC 3)

- Il principio attivo Azoxystrobin ha **attività protettiva**: inibisce la germinazione delle spore, la crescita del micelio, la formazione degli organi di riproduzione.
- Il principio attivo Difenonazolo, è un fungicida sistemico, **inibisce la biosintesi** dell'ergosterolo interferendo con la demetilazione del carbonio in C14.



Applicazione sulla pianta



COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)

AZOXYTROBIN puro	g 17,86 (= 200 g/l)
DIFECONAZOLO puro	g 11,16 (= 125 g/l)



REGISTRAZIONE

n. 18122 del 13/03/2023



CLASSIFICAZIONE

CLP  H319, H351, H410



FORMULAZIONE

Sospensione concentrata (SC)



CONFEZIONI

Flacone: 1 litro (Cartone: 12x1)



CARENZA

2-3 giorni: su pomodoro
3 giorni: su melanzana
7 giorni: su carciofo
14 giorni: su cipolla - carota
21 giorni: Barbabietola da zucchero



MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Il prodotto non è fitotossico se utilizzato sulle colture e alle dosi raccomandate.



COLTURE



PATOGENI



DOSE



NOTE

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Cercospora <i>Cercospora beticola</i>	0,5-0,8 l/ha	Max 2 trattamenti a cadenza di 21 giorni Alla prima comparsa dei sintomi BBCH 31-39
POMODORO	Peronospora <i>(Phytophthora infestans)</i>	1 l/ha	Max 2 trattamenti ad intervallo di 8-10 giorni Alla prima comparsa dei sintomi BBCH 20-59
	Alternaria (<i>Alternaria spp.</i>)	1 l/ha	Max 3 trattamenti ad intervallo di 8-10 giorni Alla prima comparsa dei sintomi BBCH 20-59
	Oidio (<i>Leveillula taurica</i>)		
MELANZANA	Oidio, (<i>Oidium spp.</i>)	1 l/ha	Max 3 trattamenti ad intervallo di 8-10 giorni Alla prima comparsa dei sintomi BBCH 20-59
CARCIOFO	Bremia (<i>Bremia spp.</i>)	1 l/ha	Max 2 trattamenti ad intervallo di 8-10 giorni Alla prima comparsa dei sintomi BBCH 41-81
CIPOLLA	Ruggine (<i>Puccinia allii</i>)	1 l/ha	Max 2 trattamenti ad intervallo di 14 giorni Alla prima comparsa dei sintomi BBCH 41-49
CAROTA	Alternaria (<i>Alternaria dauci</i>) Oidio (<i>Erysiphe heraclei</i>)	1 l/ha	Max 3 trattamenti ad intervallo di 14 giorni BBCH 40-49