



DIZOLE

FUNGICIDA SISTEMICO PER LA LOTTA CONTRO TICCHIALATURA E OIDIO DEL MELO E DEL PERO, BOLLA E MONILIA DEL PESCO, CERCOSPORIOSI DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E CONTRO ALTRE MALATTIE DELLE COLTURE ORTICOLE, ROSA E GAROFANO

CONCENTRATO EMULSIONABILE

- a base di difenoconazolo, principio attivo appartenente ai triazoli
- lunga persistenza e spiccata attività curativa.



Applicazione sulla pianta



COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)

DIFENOCONAZOLO g 23,23 (= 250 g/l)



REGISTRAZIONE

n. 15416 del 18/05/2012



CLASSIFICAZIONE

CLP



H304, H319, H336, H410



FORMULAZIONE

Concentrato emulsionabile (EC)



CONFEZIONI

Flacone: 1 litro (Cartone: 12x1)



CARENZA

21 giorni: barbabietola da zucchero, sedano. **14 giorni:** melo, pero, patata e cavolfiore. **7 giorni:** altre colture.



MISCIBILITA' E AVVERTENZE

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Osservare le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.



COLTURE



PATOGENI



DOSE



NOTE

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Cercospora beticola	0,2-0,3 l/ha	Max 3 trattamenti a cadenza di 15-20 giorni
MELO, PERO	Ticchiolatura, Oidio	15 ml/hl	Max 4 trattamenti Si raccomanda la miscela con un prodotto di copertura
ASPARAGO	Puccinia asparagi, Stemphylium Versicarium	0,5 l/ha	3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 giorni
PATATA, SEDANO, CAROTA, CAVOLFIORE	Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini, Oidi, Micosferella	0,4-0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia
POMODORO	Cladosporiosi Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini, Oidi, Micosferella	0,5 l/ha 0,4-0,5 l/ha	3-4 trattamenti ad intervallo di ca. 10 giorni 3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia
CETRIOLO	Oidi, Alternariosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-14 giorni
ROSA, GAROFANO	Oidi, Ticchiolatura, Ruggini	100 ml/hl	2-3 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni. Effettuare piccoli saggi preliminari di selettività prima di impiegare il prodotto su ampie superfici.
PESCO	Bolla Monilia	20-30 ml/hl	2-3 trattamenti da inizio emissione foglie 1-2 trattamenti pre-raccolta

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.